Rudolf Schmidt

1940
1941

Rellingen-Holstein

Berechtigt zur Führung
des dem Reichsnährstand gesetzlich geschützten

Verbandszeichens (Markenetikett)
für deutsche landwirtschaftliche Markenware

Auf die Preise
dieser Liste
gewähre ich
im Großverkauf
10 % Rabatt

Gegründet 1904

Hauptpreisverzeichnis

Herbst 1940 — Frühjahr 1941

Rudolf Schmidt, Rellingen / Holst.

Baumschulen — Rosenkulturen

Areal: 210 pr. Morgen

Mitglied der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand, des Vereins Deutscher Rosenfreunde, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und anderer Fachverbände

Eisenbahnstationen: Pinneberg und Halstenbek

Fernruf: Amt Pinneberg, Sammelnummer 3058

Drahtanschrift: Rudolf Schmidt, Rellingen (Holstein)

Postscheck-Konto: Hamburg 8229

Bank-Konto: Kreissparkasse Pinneberg

Rellingen (Holstein), Oktober 1940

Unseren sehr verehrten Geschäftsfreunden

überreichen wir hiermit unsere Hauptpreisliste 1940/41. Die durch den Krieg — fast die Hälfte unserer Gefolgschaftsmitglieder ist zum Heeresdienst eingezogen — bedingten Verhältnisse machten es erforderlich, die Hauptpreisliste in diesem Jahre in verkürzter Form herauszubringen. Zur Ergänzung stellen wir unsere vorjährige Preisliste mit ausführlichen Sortenbeschreibungen gern zur Verfügung, falls dieselbe nicht vorliegen sollte.

Unsere Kulturen befinden sich nach wie vor in bestem Zustande, so daß die Lieferung des gewohnten einwandfreien Pflanzenmaterials auch in diesem Jahre gewährleistet ist. Allerdings haben die Frostauswirkungen des letzten Winters große Lücken verursacht, besonders unter den Obstbaum- und auch unter den Koniferenbeständen.

Wir werden uns mit den uns verbliebenen Mitarbeitern restlos dafür einsetzen, daß die Versandarbeiten auch in diesem Jahre möglichst schnell und fristgemäß abgewickelt werden und uns vor allen Dingen — wie immer — um zuverlässige und sorgfältige Ausführung der Lieferungen bemühen. Wenn sich längere Lieferfristen, wie Industrie und Gewerbe sie ja auch vielfach heute in Anspruch nehmen müssen, oder kleine Unstimmigkeiten in der Ausführung auch bei uns vielleicht nicht immer ganz vermeiden lassen werden, so bitten wir zu bedenken, daß wir uns im Krieg befinden, und daß es eine Selbstverständlichkeit ist, daß der einzelne nun eben Beschränkungen in Arbeits- und Transportmöglichkeiten auf sich nehmen muß.

Die unvergleichlichen Erfolge unserer Führung und unserer Wehrmacht dürfen uns erwarten lassen, daß wir bald wieder zu normalen Arbeitsverhältnissen zurückkehren werden. Wir werden uns natürlich dafür einsetzen, unsere Kulturen und Bestände auf den dann wieder zu erwartenden normalen und wahrscheinlich ja noch gesteigerten Bedarf abzustellen.

Mit deutschem Gruß!

Rudolf Schmidt

Obstbäume und Beerenobst

Die nachstehenden Preise verstehen sich sämtlich für eine **prima 1. Güteklasse** gemäß den Güteklassenbezeichnungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand. Bäume mittlerer Güteklasse sind 20 % billiger

I. Obstbäume

Sortenverzeichnis siehe Seite 7—9

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Aepfel			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	}	geräumt	
Halbstämme, 6—7 cm Umfang	}		
Büsche, 2—3jährig	2.—	18.—	—
„ 3—4jährig	2.50	22.50	—
Pyramiden mit 1 Serie, 2—3jährig	2.50	22.50	—
„ mit 2 Serien, 3—4jährig	3.50	32.—	—
Spaliere mit 1 Etage	2.50	22.50	200.—
„ mit 2 Etagen	3.50	32.—	280.—
Verrier-Palmetten mit 4 Ästen	12.—	—	—
U-Formen mit 2 Ästen, 2—3jährig	3.—	—	—
„ mit 2 Ästen, 3—4jährig	3.70	—	—
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig	2.—	18.—	160.—
„ „ 3—4jährig	2.50	22.50	—
„ wagerecht, 1armig, 2—3jährig	2.20	20.—	—
„ „ 1armig, 3—4jährig	3.—	27.—	—
„ „ 2armig, 2—3jährig	3.—	27.—	—
„ „ 2armig, 3—4jährig	3.70	33.50	—
1jährige Veredlungen auf Doucin und Wildling	1.—	9.—	80.—
Birnen			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	} Große Frostausfälle, die geringen Bestände sind bereits geräumt.		
Halbstämme, 6—7 cm Umfang			
Büsche, 2—3jährig			
„ 3—4jährig			
Pyramiden mit 1 Serie, 2—3jährig			
„ mit 2 Serien, 3—4jährig			
Spaliere mit 1 Etage			
„ mit 2 Etagen			
Verrier-Palmetten mit 4 Ästen			
U-Formen mit 2 Ästen, 2—3jährig			
„ mit 2 Ästen, 3—4jährig			
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig			
„ „ 3—4jährig			
„ wagerecht, 1armig, 2—3jährig			
„ „ 1armig, 3—4jährig			
„ „ 2armig, 2—3jährig			
„ „ 2armig, 3—4jährig			
1jährige Veredlungen auf Wildling und Quitte	1.—	9.—	—
Pflaumen und Zwetschen			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	}	geräumt	
Halbstämme, 6—7 cm Umfang	}		
Büsche, 2—3jährig	2.—	18.—	—
Süß- und Sauerkirschen			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	}	geräumt	
Halbstämme, 6—7 cm Umfang	}		
Sauerkirschen-Büsche, 2—3jährig	1.75	16.—	145.—
Sauerkirschen-Spaliere, Fächerform, 1j. Veredl., 90—120 cm breit	2.—	18.—	—
Sauerkirschen-Spaliere, Fächerform, 2—3j. Veredl., 120—150 cm breit	2.65	24.—	—

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Schattenmorellen			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang		geräumt	
Halbstämme, 6—7 cm Umfang			
Büsche, 1jährige Veredlungen auf Prunus mahaleb	1.30	12.—	—
„ 2—3jährige „ „ „	1.75	16.—	—
Spaliere, Fächerform, 1jährige Veredlungen, 90—120 cm breit	2.—	18.—	—
„ „ 2—3jähr. Veredlungen, 120—150 cm breit	2.65	24.—	—
Aprikosen und Pfirsiche			
Hochstämme	4.—	—	—
Halbstämme	3.—	27.—	—
Büsche, veredelt, stark	2.—	18.—	170.—
Spaliere, Fächerform, 1jährige Veredlungen, stark	3.50	32.—	—
Mispeln			
Büsche	2.—	18.—	—
Quitten			
Halbstämme		geräumt	
Büsche	2.—	18.—	—
Walnüsse			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	5.35	50.—	—
„ 8—10 „ „	6.—	56.—	—
„ 10—12 „ „	7.40	—	—
„ 12—14 „ „	8.80	—	—
Halbstämme, ca. 125—150 cm Stammhöhe	4.—	36.—	—
Heister, 125—150 cm	1.80	17.—	160.—
„ 150—200 cm	2.65	25.50	—
Eßbare Eberesche			
(Sorbus aucuparia moravica), siehe „Laubhölzer"			
II. Beerenobst			
Johannisbeeren			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe, I. Qualität	1.35	12.50	—
Rotfrüchtig: Heros, Rote Holländische, Vierländer Rote **Schwarzfrüchtig:** Goliath, Rosenthals Lange Schwarze Traube **Weißfrüchtig:** Weiße Jüterboger, Weiße Kaiserliche, Weiße Versailler			
Halbstämme, 70—90 cm Stammhöhe, I. Qualität	1.10	10.—	—
Rotfrüchtig: Heros, Rote Holländische, Vierländer Rote **Schwarzfrüchtig:** Rosenthals Lange Schwarze Traube **Weißfrüchtig:** Weiße Jüterboger, Weiße Versailler.			

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Johannisbeeren (Fortsetzung)			
Büsche, wüchsige, langtriebige Ware:			
Rotfrüchtig:			
Fays Fruchtbare, Große Rote aus Boulogne, Rote Holländische, Rote Kaukasische, Rote Versailler			
2jährige Büsche mit 3—5 Trieben	0.30	2.50	22.50
3jährige Büsche mit 5—8 Trieben	0.40	3.30	30.—
4jährige Büsche mit 8—12 Trieben	0.45	4.—	35.—
Vierländer Rote			
2jährige Büsche mit 3—5 Trieben	0.40	3.20	28.—
3jährige Büsche mit 5—8 Trieben	0.50	4.—	37.50
4jährige Büsche mit 8—12 Trieben	0.60	5.—	47.—
Heros			
2jährige Büsche mit 3—5 Trieben	0.45	4.—	33.—
3jährige Büsche mit 5—8 Trieben	0.60	5.—	47.—
Schwarzfrüchtig:			
Bang up, Goliath, Lees Schwarze, Rosenthals Lange Schwarze Traube, Schwarze Riesenbeere, Schwarze Traube			
2jährige Büsche mit 3—5 Trieben . per 1000 St. 250.—	0.40	3.20	28.—
3jährige Büsche mit 5—8 Trieben . per 1000 St. 340.—	0.50	4.—	37.50
4jährige Büsche mit 8—12 Trieben	0.60	5.—	47.—
Weißfrüchtig:			
Bar le Duc, Weiße Holländische, Weiße Langtraubige, Weiße Versailler			
2jährige Büsche mit 3—5 Trieben	0.40	3.20	28.—
3jährige Büsche mit 5—8 Trieben	0.50	4.—	37.50
4jährige Büsche mit 8—12 Trieben	0.60	5.—	47.—
Weiße Jüterboger			
2jährige Büsche mit 3—5 Trieben	0.45	4.—	33.—
3jährige Büsche mit 5—8 Trieben	0.60	5.—	47.—
Stachelbeeren			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe, I. Qualität	1.35	12.50	—
Halbstämme, 70—90 cm Stammhöhe, I. Qualität	1.10	10.—	—
Büsche, gesunde, langtriebige, meltaufreie Ware			
mit 3—5 Trieben	0.40	3.30	—
mit 5—8 Trieben	0.55	5.—	—
mit 8—12 Trieben	0.65	6.—	—
Amerikanische Gebirgsstachelbeere (Mountain seedling)			
Büsche mit 3—5 Trieben	0.30	2.50	22.50
Büsche mit 5—8 Trieben	0.40	3.30	30.—
Büsche mit 8—12 Trieben	0.45	4.—	35.—
Sonstiges			
Himbeeren: Lloyd George, Preußen . per 1000 St. 135.—	0.20	1.80	15.—
Aufschulware, siehe „Junggehölze"			
„ Deutschland . . . . . per 1000 St. 175.—	0.30	2.50	20.—
„ Golden Queen	0.30	2.50	22.50
„ Shaffers Colossal	0.50	4.50	40.—
Brombeeren, verschulte Pflanzen	0.50	4.50	40.—
Aufrechtwachsend: Wilsons Frühe			
Kletternd: Lucretia, Theodor Reimers (Sandbrombeere)			
Weinreben (stammen direkt aus behördlich anerkannten Rebschulen)			
starke Freilandpflanzen	1.60	15.—	135.—
mit Topfballen, 2jährig	3.30	30.—	—
Haselnüsse, in großfrüchtigen Sorten	1.30	12.—	110.—
„ aus Samen gezogen (Corylus avellana)	0.70	6.50	60.—
Hagebutten (Rosa rugosa)	0.50	4.50	40.—
Fliederbeeren, aus Stecklingen gezogene Nachzucht einer ausgesucht großfrüchtigen und gleichmäßig reifenden Form	0.90	8.—	—
Japanische Weinbeere (Rubus phoenicolasius)	0.50	4.50	40.—
Loganbeere (Loganberry), Bastard zwischen Himbeere und Brombeere	1.10	10.—	—

Vorrätige Obstsorten

Mein Hauptpreisverzeichnis 1939/40, das eine Beschreibung aller Obstsorten enthält, wird auf Wunsch gern zur Verfügung gestellt.

Nachstehend gebe ich eine Übersicht der vorrätigen Sorten. In Buchstaben ist, hinter den Sortennamen stehend, angegeben, in welcher Baumform die betreffenden Sorten vorrätig sind.

H = Hochstamm	s = senkrechter Schnurbaum	U = U-Form
h = Halbstamm	S = Spalier	F = Fächer
B = Busch oder Pyramide	C = wagerechter Schnurbaum	Vg = 1j. Veredlungen

Vor den Sortennamen stehend sind Tafelobstsorten mit T, Wirtschaftsobstsorten mit W bezeichnet. Die Verdoppelung gibt den größeren Wert der Sorten an.

Infolge der außerordentlichen Frostschäden des letzten Winters sind die Vorräte in den meisten Sorten und Formen nur gering, soweit nicht verschiedene in diesem Jahre ganz ausfallen. Ich habe nur bei denjenigen Sorten Bestände angegeben, von denen solche bei Drucklegung des Kataloges noch vorhanden waren.

Aepfel

Sommeräpfel:

TW **Charlamowsky**, B, s, S, C
TTW **Croncels** (Apfel aus), s, S, C
TW **Klarapfel** (weißer), s, S, C, U
TW **Säfstaholm**
TW **Suislepper**
TTW **Schöner aus Bath**

Herbstäpfel:

TTW **Antonowka**, B, s, S
TWW **Cellini**, B, C
TW **Cox' Pomona**, B, s, S
TTWW **Finkenwärder Prinzenapfel**
TTWW **Gelber Richard**, B, s, C
TTWW **Gravensteiner**, s, S, C
TW **Großherzog Friedrich**, B, s
TW **Jakob Lebel**, s, S, C, U
TTWW **James Grieve**, s, S
WW **Lord Grosvenor**, B, s
TWW **Manks' Apfel (Eve-Apfel)**, B, s
TTW **Ostpreußischer Kurzstiel**
TWW **Prinzenapfel**
TTW **Signe Tillisch**, B, s, C
TTWW **Wohlschmeckender**, B, s

Winteräpfel:

T **Adersleber Kalvill**, s, S, C
TTW **Akerö**
TW **Altländer Pfannkuchenapfel**, s
TTW **Ananasrenette**, h
TTW **Angler Borsdorfer**
TW **Baumanns Renette**, B, S, C, U
WW **Birsmarckapfel**, s
TTW **Blenheimer Goldrenette**, s, S, C
WW **Bohnapfel** (Großer rheinischer)
WW **Boikenapfel**
TWW **Coulons Renette**, B, s
TTWW **Cox' Orangenrenette**, s, S, C
TW **Danziger Kantapfel**, B, s
TTWW **Englischer Winterprinz**, B, s, S
TW **Filippas Apfel**, B, s
TTW **Freiherr von Berlepsch**, B, s
TTW **Geheimrat Breuhahn**, B, s

Büsche 2—3j. per St. RM. 3.30
Senkrechte Schnurbäume 2—3j. per St. RM. 3.30

TW **Geheimrat Oldenburg**, s, U
TTW **Gelber Bellefleur**, B, s
TW **Gelber Edelapfel**, s, S, C
W **Gelber Winterstettiner**
TTWW **Goldparmäne**, s, C
TW **Grahams Jubiläumsapfel**, B, s, S
WW **Horneburger Pfannkuchapfel**, h
TW **Kaiser Wilhelm**, s
TW **Kanadarenette** (Pariser Rambour-Renette), h
TW **Kasseler Renette**, B, s, S, C
TTWW **Krügers Dickstiel** (Achimer Renette, Celler Dickstiel, Woltmanns Renette), s, S
TWW **Landsberger Renette**, s, S, C
TTW **Lanes Prinz Albert**, B, s
TTWW **Martiniapfel**, s
TW **Minister von Hammerstein**, s, S, C
TW **Nathusius' Taubenapfel**, h, s, S
TW **Neuer Berner Rosenapfel**, s
TW **Ontarioapfel**, B, s, S, C
TW **Peasgoods Sondergleichen**, S, C
WW **Purpurroter Cousinot**, B, s
TTWW **Ribstoner Pepping**, B, s, S
TWW **Roter Eiserapfel**
TW **Rote Sternrenette**, s
TW **Schmalzprinz** (Kardinal Prinz), h, B, s
TTWW **Schöner aus Boskoop**, B, s, S, C
TW **Schöner aus Herrnhut**, B, s
TW **Schöner aus Nordhausen**, s
TWW **Stahls Winterprinz**
TW **Stina Lohmann**, h, s
TTW **Zuccalmaglios Renette**, B, s, S, C

Birnen

Da es Birnenbüsche und senkrechte Schnurbäume in diesem Jahre gar nicht gibt, verweise ich auf die angebotenen einjährigen Veredlungen.

Sommerbirnen:

TW **Bunte Julibirne**
TWW **Clapps Liebling**, Vg.
TW **Frühe aus Trévoux**
TWW **Gute Graue**
TW **Jules Guyot**, Vg.
TW **Julidechantsbirne**
TTW **Kongreßbirne** (Andenken an den Kongreß), Vg.
TW **Sommermagdalene** (grüne)
TTWW **Williams' Christbirne**, Vg.

Herbstbirnen:

TW **Alexander Lucas**, Vg.
TW **Amanliser Butterbirne**
TTW **Blumenbachs Butterbirne**
TTW **Boscs Flaschenbirne** (Calebasse, Kaiserkrone)
TW **Clairgeau** (-s Butterbirne), Vg.
TTWW **Esperens Herrenbirne**, Vg.
TTW **Gellerts Butterbirne**, s
TTW **Graf Molke**, Vg.
TTW **Gute Luise**
TTWW **Köstliche aus Charneu** (Bürgermeisterbirne)
TW **Napoleons Butterbirne**
TW **Neue Poiteau**
TWW **Philippsbirne** (doppelte), Vg.
TWW **Rote Herbstbergamotte**
TTW **Triumph aus Vienne**
TTWW **Vereinsdechantsbirne**, Vg.

Winterbirnen:

TTW **Diels Butterbirne**, Vg.
TW **Esperens Bergamotte**
T **Gräfin von Paris**, Vg.
WW **Großer Katzenkopf**
TWW **Herrenhäuser Winterchristbirne**
TTW **Josephine aus Mecheln**, Vg.
T **Le Lectier**, Vg.
TT **Liegels Butterbirne**
TWW **Nordhäuser Forellenbirne**
TWW **Pastorenbirne**, Vg.

Pflaumen und Zwetschen

Anna Späth
Bühler Frühzwetsche, B
Emma Leppermann, B
Esperens Goldpflaume
Fürsts Frühzwetsche
Gelbe Eierpflaume
Graf Althans (Reneklode)
Große Grüne Reneklode, B
Hauszwetsche
Italienische Zwetsche
Jefferson
Königin Viktoria, B
Königspflaume aus Tours
Lützelsachser Frühzwetsche
Nancymirabelle, B
Ontariopflaume, B
Ouillins (Reneklode)
Ruth Gerstetter
Saure Altenländer Frühzwetsche
Schöne aus Löwen, B
The Czar
Wangenheims Frühzwetsche, B
Washington, B
Wilhelmine Späth, B
Zesterfleth
Zimmers Frühzwetsche

Kirschen

Sauerkirschen:

Diemitzer Amarelle, B, S
Exzellenz von Hindenburg, B, S
Königin Hortense, B, S
Ostheimer Weichsel, B, S
Rote Maikirsche, B
Spanische Glaskirsche, B
Schattenmorelle (Große Lange Lotkirsche), B, S

Süßkirschen:

Büttners Rote Knorpelkirsche
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche
Eltonkirsche
Flamentiner (Türkine)
Fromms Herzkirsche
Frühe Schwarze Altenländer
Früheste der Mark
Große Prinzessinkirsche
Große Schwarze Knorpelkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
Kassins Frühe
Kunzes Kirsche
Lucienkirsche
Schneiders Späte Knorpelkirsche
Werdersche Frühe Herzkirsche

Aprikosen

Ambrosia, h
Bredaaprikose, H, h
Nancyaprikose, H, h, B
Ungarische Beste, H, h, B
Wahre Große Frühaprikose, h

Pfirsiche

Alexanderpfirsich, B
Amsden, H, h, B
Beatrix, h
Cumberland, B
Eiserner Kanzler, h, B
Früher York, B
Madame Rogniat, h, B
Mayflower, h, B
Präsident Griepenkerl, B
Proskauerpfirsich, h, B
Rekord von Alfter, h, B

ROSEN

Eigene Anzucht jährlich mehrere hunderttausend Stück. Das nachstehende Sortiment umfaßt nur erprobte ältere und neuere Sorten. Die Anzuchtsbedingungen für ein gut ausgereiftes, widerstandsfähiges und wüchsiges Pflanzenmaterial sind die denkbar günstigsten. Auf streng reelle Sortierung wird besonderer Wert gelegt.

Preisübersicht für Rosen

1. Niedrige Rosen

Preis-gruppe	I. Wahl				Mittelwahl				II. Wahl			
	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
1	0.40	3.70	33.60	324.—	0.30	2.80	25.20	243.—	0.25	2.—	16.80	162.—
2	0.50	4.50	38.—	—	0.35	3.25	28.50	—	0.25	2.25	19.—	—
3	0.55	5.—	44.—	—	0.40	3.75	33.—	—	0.30	2.50	22.—	—
4	0.60	5.50	50.—	—	0.45	4.25	37.50	—	0.35	3.—	25.—	—
5	0.70	6.50	60.—	540.—	0.50	5.—	45.—	400.—	0.40	3.50	30.—	270.—
6	0.80	7.50	70.—	—	0.60	5.50	52.50	—	0.45	4.—	35.—	—
7	1.—	9.50	90.—	—	0.75	7.—	67.50	—	0.55	5.—	45.—	—
8	1.45	14.—	135.—	—	1.10	10.50	100.—	—	0.80	7.25	67.50	—

Zum Eintopfen

auf Rosa multiflora veredelt, prima I. Wahl (Treibqualität) 100 St. RM. 44.—, 1000 St. RM. 400.— Mittelqualität ist 25 % billiger.

Die auch auf Rosa multiflora vorrätigen Sorten sind in dem Sortenverzeichnis neben der Preisgruppenangabe mit einem M bezeichnet.

Für die während der Frühjahrsversandzeit (nach dem 1. Februar) zum Versand gelangenden niedrigen Rosen — einschließlich der Polyantharosen, Kletterrosen und Park- und Moosrosen — **wird ein Überwinterungszuschlag von 10 % berechnet.**

2. Hochstämmige Rosen

(auf Sämlingsstämmen veredelt)

	I. Wahl			Mittelwahl			II. Wahl		
	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St RM.
Trauerstämme und Maréchal-Niel-Stämme									
160 cm und höher	Wegen Frostschaden nicht lieferbar								
140—160 cm									
Hochstämme 100—140 cm	2.—	18.50	—	1.60	15.—	—	1.20	11.50	—
Mittelstämme 75—100 cm	1.50	13.50	—	1.15	10.50	—	0.90	8.—	—
Halbstämme 50—75 cm	Wegen Frostschaden nicht lieferbar								
Fußstämme 30—50 cm									

Vorrätige Rosensorten

Zeichenerklärung:

betr. Gattung: K = Kletterrosen, P = Polyantharosen, R = Remontantrosen, Rug = Rosa-rugosa-Rosen, T = Teerosen, TH = Teehybridrosen, L = Rosa Lutea (Pernetiana), M = Moosrosen, G = Garten- und Parkrosen, Lamb. = Lambertianarosen

betr. Eignung: T = für Treiberei, S = für Blumenschnitt, G = für den Garten und für Gruppenpflanzung

Preisgruppe	Gattung	Eignung	Name und Farbenangabe
			Tee-, Teehybrid-, Remontant- und Lutea-(Rosa Pernetiana) Rosen
1	TH	TSG	**Amulett,** Blume stark gefüllt, feurigdunkelrot
1	TH	SG	**Anni Jebens,** Blume groß, sehr gut gefüllt, außen goldgelb, innen blutrot
1	TH	TSG	**Arabella,** Sport von „Mad. C. Testout" karminrosa
1	TH	TSG	**Barcelona,** außen karminrot, innen sammetartig dunkelrot, starkwüchsig
5	TH	TS	**Better Times,** Sport von „Briarcliff", vorzügl. gefüllt, dunkelblutrot
1	TH	TG	**Betty Uprichard,** außen lachsrosa, innen gelb-orange-rosa
5	TH	GS	**Brasier,** feurig-scharlachrot mit goldgelb
2 M	TH	TS	**Briarcliff,** verbesserte „Columbia", dunkelrosa
1	R	TG	**Captain Hayward,** hellrot
1	TH	TSG	**Cathrine Kordes,** leuchtend rubinrot mit sammetartig blutrot schattiert
2	TH	SG	**Comtesse Vandal,** außen kupferrot, in kupferrosa übergehend, innen bräunlichgelb
1	TH	TS	**Covent Garden,** Blume sehr groß, lebhaft dunkelrot
3	TH	SG	**Crimson Glory,** karmesinrot, sammetartig dunkel schattiert
1 M	TH	TSG	**Dame Edith Helen,** Blume sehr groß, leuchtend reinrosa
8	TH	SG	**Dicksons Perfection,** rosa-orange auf orangegelbem Grund
4	TH	G	**Effekt,** außen goldgelb, innen karminlachsrot
2 M	TH	TSG	**E. G. Hill,** Blume groß, von schöner, dunkelkarminroter Farbe
1 M	TH	TSG	**Etoile de Hollande,** sehr schön dunkelblutrot, stark duftend
1	R	TS	**Eugen Fürst,** sammetartig dunkelkarminrot
1	R	TS	**Fisher et Holmes,** leuchtend scharlachrot
1 M	TH	TSG	**Florex,** stark duftend, orangerosa mit orangekarmin
1	R	TSG	**Frau Karl Druschki,** blendend reinweiß, Knospe außen rosa überhaucht
3	TH	G	**Frieda Krause,** leuchtend feurig-rubinlachsrot
2	TH	TSG	**Fritz Höger,** rein dunkelrot
2 M	TH	TSG	**Geheimrat Duisberg,** reingelb, Blume sehr schön geformt
1	TH	SG	**General Mac Arthur,** Blume schalenförmig, leuchtend blutrot
1	TH	SG	**Gloire de Hollande,** Blume sehr groß, schwärzlichrot
7	TH	TS	**Gloria di Roma,** leuchtendrote „Dame Edith Helen"
1	TH	SG	**Goldenes Mainz,** leuchtendgelb
1	TH	TSG	**Golden Ophelia,** Blume sehr schön geformt, reingoldgelb
5	TH	G	**Granat,** Knospe sammetartig schwarzrot, Blume schwärzlichrot
2	TH	G	**Gruß an Teplitz,** Blume in Büscheln, leuchtendrot
1 M	TH	TSG	**Hadley-Rose,** dunkelrot, schwärzlich schattiert
1 M	L	TSG	**Heinrich Wendland,** außen leuchtend goldgelb, innen kapuziner-braunrot
2 M	TH	SG	**Heros,** edel geformt, rot
2	L	TSG	**Hinrich Gaede,** bräunlich-orange-gelb, schöne Farbenrose
1	R	TS	**Hugh Dickson,** Blume groß, leuchtend feurigrot
2	TH	SG	**Jan Abbing,** leuchtend lachsrot mit gelblicher Tönung
1	TH	TSG	**Joanna Hill,** gelb
1	TH	TS	**Jonkher J. L. Mock,** Blume sehr groß, karminrosa, innen silbrig-weiß
1	TH	TSG	**Josef Strnad,** korallenrot mit lachsrosa Schein
1	L	SG	**Julien Potin,** rein goldgelb
2	L	G	**Juliet,** außen goldgelb, innen kapuzinerrot
2 M	TH	TSG	**Kaiserin Auguste Viktoria,** weiß auf grünlich-gelbem Grund
2	L	TSG	**Kidway,** Blume leuchtend goldgelb, orange- und kupferfarben überhaucht
2	TH	TS	**Kurt Scholz,** Blume enorm groß, scharlachrot
1 M	TH	SG	**Luna,** Blume groß, eiförmig, reingelb, duftend
1	TH	TSG	**Mme. Butterfly,** Sport von „Ophelia", fleischfarbig-orange
1	TH	TSG	**Mme. Caroline Testout,** bekannte alte Sorte, silbrig-rosa
1	L	G	**Mme. Edouard Herriot,** leuchtend kupfrig- bis tangorot
1 M	TH	TSG	**Mme. G. Forest Colcombet,** glänzend dunkelkarminrot, scharlachrot durchleuchtet

ROSENSORTEN

Preisgruppe	Gattung	Eignung	Name und Farbenangabe
1	TH	TS	**Mme. Jules Bouché,** blendend reinweiß, zuweilen rosig schattiert
1	L	SG	**Mme. Raymond Gaujard,** kupferfarben, in hellgoldgelb übergehend
1	TH	SG	**Mc. Gredy's Scarlet,** samtig karmesinrot auf orangegelbem Grund
5	T	TS	**Maréchal Niel,** sehr edle Form, köstlich duftend, rein schwefelgelb
2 M	L	TSG	**Mary Hart,** sammetartig blutrot
2	TH	TSG	**Max Krause,** rötlich orangegelb, beim Aufblühen in goldgelb übergehend, von edler spitzer Form
1	L	SG	**Mevrouw G. A. van Rossem,** braunrot, bronzefarbig schattiert und gefleckt auf goldgelbem Grund
2	TH	SG	**Miß C. E. van Rossem,** leuchtend sammetartig blutrot
1	TH	TSG	**Mrs. Charles Lamplough,** Blume sehr groß, milchweiß
4	TH	G	**Mrs. Edward Laxton,** leuchtend orange
2 M	L	TSG	**Mrs. Frank D. Roosevelt,** goldgelb
1	TH	SG	**Mrs. Henry Morse,** glänzend rosa mit zinnoberrot schattiert
1 M	TH	TSG	**Mrs. Henry Winnet,** Blume groß, leuchtend scharlachrot
1	R	TS	**Mrs. John Laing,** seidenartig reinrosa, duftend
2	TH	TSG	**Mrs. L. B. Coddington,** gelblichorangerosa mit rötlichem Schein
2	TH	SG	**Mrs. Pierre S. du Pont,** schön tiefgelb
1	TH	SG	**Mrs. Sam. Mc. Gredy,** scharlach-kupfrig-orange, außen rot schattiert
3	TH	G	**Nigrette,** schwärzlichrot
1	TH	TSG	**Ophelia,** fleischfarbig-gelblichweiß
2	TH	SG	**Oswald Sieper,** weiß, im Zentrum schwefelgelb
1	R	TS	**Paul Neyron,** Blume außerordentlich groß, reinrosa
1 M	L	TSG	**Président Herbert Hoover,** goldgelb mit feuerrot schattiert
1	TH	TS	**Professor Gnau,** mattgelb, im Aufblühen in rahmweiß übergehend
1 M	TH	TSG	**Rapture,** aprikosen-korallenfarbig mit rosa und goldgelb
1	L	SG	**Reverend F. Page Roberts,** goldorangegelb, gute Gruppenrose
5	TH	TSG	**R. M. S. Queen Mary,** Blume sehr groß, leuchtend dunkellachs-orange
1 M	TH	TS	**Roselandia,** verbesserte „Golden Ophelia", goldgelb
1	TH	TS	**Roslyn,** rein sonnengelb, außen orange schattiert
3 M	TH	TSG	**Rote Rapture,** Sport von „Rapture", Farbe hell kirschrot
4	TH	G	**Sonnengold,** leuchtend rein sonnengelb
1	L	SG	**Souvenir de Georges Pernet,** leuchtend türkischrot
1	TH	TSG	**Souvenir de H. A. Verschuren,** cadmiumgelb, in orangegelb übergehend
2 M	TH	TSG	**Sterling,** Blume groß, leuchtend reinrosa
1 M	L	TSG	**Talisman,** Farbenrose, goldgelb und kupfer, scharlachrot getönt
5	TH	G	**Tarantella,** sehr wertvolle Gartenrose, dunkelorangegelb
4	TH	TSG	**Texas Centennial,** Sport der Sorte „Président Herbert Hoover", bronzerot bis braunrot
1	R	TS	**Ulrich Brunner fils,** rein kirschrot
2	TH	TS	**Vierlanden,** orangerosa
2	TH	TSG	**W. E. Chaplin,** verbesserte „Lord Charlemont", leuchtendrot
1	L	TSG	**Wilhelm Kordes,** Farbenrose, kapuziner-braunrot auf goldgelbem Grund

Polyantharosen (Vielblumige Rosen)

Eignen sich ihres meistens niedrigen, gleichmäßigen Wuchses, vor allen Dingen aber ihres reichen, unaufhörlichen Blühens halber vorzüglich zur Bepflanzung von Rabatten und Beeten und für Einfassungen, aber auch für Topfkultur.

Preisgruppe	Gattung	Name und Farbenangabe
3 M	P	**Anne Mette Poulsen,** Polyanthahybride, halbgefüllt, leuchtend feurigblutrot
3 M	P	**Betty Prior,** Blume einfach, außen dunkel-karmesinrosa, innen etwas heller
3 M	P	**Dagmar Späth,** Sport von „Josef Guy", alabasterweiß mit zartrosa überhaucht
3 M	P	**Dick Koster,** hellachsrosa bis orange, vorzügliche Treibsorte
1 M	P	**D. T. Poulsen,** rein blutrote Polyanthahybride, Blume gut gefüllt
2 M	P	**Eblouissant,** Blume gefüllt, feurig karminrot mit dunkler Schattierung
2 M	P	**Ellen Poulsen,** kirschrosa, gefüllt
1 M	P	**Else Poulsen,** halbgefüllt, großblumig, zartrosa
2 M	P	**Eva Teschendorff,** reinweißer Sport der Sorte „Echo"
2 M	P	**Feuerschein,** Sport der Sorte „Josef Guy", leuchtend feurigrot
2 M	P	**Fortschritt,** ziemlich gefüllt, primelgelb, orangerosa schattiert
2 M	P	**Frau Astrid Späth,** leuchtend karminrosa, Sport der bekannten „Josef Guy"

ROSENSORTEN

Preis-gruppe	Gattung	Name und Farbenangabe
1 M	P	**Frau Rudolf Schmidt**, feurig-rot, gut gefüllt
2 M	P	**Freudenfeuer**, Blume gefüllt, leuchtend kirschrot
2 M	P	**Gloria Mundi**, gefüllt, feurigorange
2 M	P	**Gruppenkönigin**, gefüllt, kräftig karminrosa
1 M	P	**Gruß an Aachen**, gelblichrosa, gut gefüllt
2 M	P	**Heidekind**, gefüllt, korallenrosa
2 M	P	**J. F. Müller**, Sport 1er Sorte „Rödhätte", leuchtend feurigrot
2 M	P	**Josef Guy**, Sport der Sorte „Rödhätte", leuchtend scharlachrot
2 M	P	**Karen Poulsen**, Blume einfach, feurig-purpurrot, in enorm großen Dolden
2 M	P	**Kirsten Poulsen**, Blume einfach, feurig purpurrot, in enorm großen Dolden
5	P	**Koralle**, besonders wertvoller, leuchtendroter Sport von „Else Poulsen"
2 M	P	**Lady Reading**, leuchtendroter Sport von „Ellen Poulsen"
2 M	P	**Mevr. van Nes**, leuchtend karminrot, Blütenblätter gefranst und gewellt
1 M	P	**Miß Edith Cavell**, dunkelroter Sport von „Orléansrose"
1 M	P	**Nathalie Nypels**, Blume kräftig rosa, halb gefüllt
2 M	P	**Paul Crampel**, zinnoberrot
5	P	**Poulsens Yellow**, reingelb, halbgefüllt
2 M	P	**Rödhätte**, leuchtend kirschrot
2 M	P	**Rosa Gruß an Aachen**, rosa Form der Stammsorte
3 M	P	**Rosenelie**, außen silbrigrosa, innen rosigweiß
2 M	P	**Rote Else Poulsen**, Sport von „Else Poulsen", leuchtend hellrot
2 M	P	**Rouge**, Sport von „Rödhätte", Blume gefüllt, leuchtend scharlachrot
1 M	P	**Rudolph Kluis superior**, Blume gefüllt, lebhaft rot
2 M	P	**Senta Schmidt**, gelblich-orange
3 M	P	**Swantje**, stark gefüllt, weiß mit gelblichem Schimmer
6 M	P	**Topas**, hellgelb, beim Aufblühen in sattes Gelb übergehend
1 M	P	**Verdun**, purpurkarminrot, besonders wertvoll für Treiberei

Kletterrosen (Rankende Rosen)

Dieselben eignen sich sehr gut zur Berankung von Hauswänden, für Hecken, Laubengänge, Pyramiden etc., sind auch zum Beranken von Böschungen hervorragend geeignet.

Preis-gruppe	Gattung	Name und Farbenangabe
5	K	**American Pillar**, Blume einfach, rosenrot mit weißer Mitte
5	P	**Auguste Kordes**, rankender Sport der bekannten Polyantharose „Josef Guy", feurig scharlachrot
5	S	**Blaze**, immerblühende „Paul's Scarlet Climber"
6	K	**Captain Kidd**, Blume edelrosenähnlich, vollgefüllt, dunkelblutrot
5	K	**Dorothy Perkins**, reinrosa, gut gefüllt
5	K	**Düsterlohe**, Blume einfach, groß, dunkelrosa
		Eva, siehe „Park- und Moosrosen"
5	K	**Excelsa**, leuchtend blutrot, gut gefüllt
5	K	**Frl. Octavia Hesse**, reinweiß auf gelbem Grund, edelrosenähnlich
5	K	**Glenn Dale**, edelrosenähnlich, gut gefüllt, duftend, zitronengelb
5	T	**Gloire de Dijon**, hellgelb, rosa schattiert, Blume sehr groß, vollgefüllt, duftend
		Hamburg, siehe „Park- und Moosrosen"
		Herrenhausen, siehe „Park- und Moosrosen"
5	K	**Käte Schmid**, verbesserte „Tausendschön", Farbe etwas dunkler rosa
5	L	**Le Rêve**, Blume sehr groß, halbgefüllt, leuchtend sonnenblumengelb
5	K	**Long John Silver**, dicht gefüllt, lange haltbar, schneeweiß
5	K	**Louis Rödiger**, Blume sehr groß, orangegelb
5	K	**New Dawn**, immerblühend, Blumen edelrosenähnlich, zartrosa
5	K	**Paul's Scarlet Climber**, leuchtend scharlachrot, gefüllt, sehr lange haltbar
6	K	**Primevère**, Blume groß, gefüllt, edelrosenähnlich, duftend, rein sonnengelb
5	P	**Prinses van Oranje**, Sport der Polyantharose „Gloria Mundi", Blütenfarbe auffallend feurigorange
6	K	**Professor Ibrahim**, Blume edelrosenähnlich, nelkenrosa auf gelbem Grund, stark duftend
5	K	**Red Explorer**, immerblühend, scharlachrot, schwärzlich schattiert
		Rostock, siehe „Park- und Moosrosen"
5	K	**Royal Scarlet Hybrid**, feurigscharlachrot, halbgefüllt
		Sangerhausen, siehe „Park- und Moosrosen"
		Schwerin, siehe „Park- und Moosrosen"
5	K	**Tausendschön**, in großen, lockeren Dolden blühend, zartrosa
5	K	**Venusta pendula**, sehr starkwüchsig, weiß, rosig angehaucht
		Wilhelm, siehe „Park- und Moosrosen"

Park- und Moosrosen

Aus Samen gezogene Wildrosen, siehe „Laubhölzer".

Preis-gruppe	Gattung	Name und Farbenangabe
5	G	**Andersonii,** Blume sehr groß, einfach, kräftig karminrosa
5	L	**Austrian Yellow,** leuchtend reingelb, einfache, große Blume
5	M	**Blanche Moreau,** reinweiß, gefüllt, einmal blühend
5	M	**Captain John Ingram,** schwärzlichrot, einmal blühend
5	Rug.	**Carmen,** Blume einfach, dunkelblutrot, remontierend
5	M	**Centifolia muscosa,** Blume mittelgroß bis klein, kräftig rosa, einmal blühend
5	Rug.	**Conrad Ferdinand Meyer,** Blume groß, duftend, schön geformt, silbrigrosa
5	M	**Cristata,** Blume groß, gefüllt, tiefrosa, einmal blühend
5	Rug.	**Dr. Eckener,** Blume groß, sattgelb, mit orange durchzogen
5	Lamb.	**Eva,** Blume sehr groß, ungefüllt, leuchtend blutrot
5	G	**Fargesii,** ähnlich R. Moyesii, Blume einfach, leuchtend samtig-dunkelkarminrot
5	Rug.	**F. J. Grootendorst,** Nelkenrose, Blume nelkenähnlich, leuchtendrot
5	G	**Geschwinds Nordlandsrose,** Blume gefüllt, zartrosa
5	Rug.	**Goldener Traum,** Blume groß, gefüllt, leuchtend goldgelb, duftend
5	Lamb.	**Hamburg,** Blume sehr groß, halbgefüllt, feurigscharlachrot, immerblühend
5	G	**Hermann Löns,** Blume enorm groß, einfach, leuchtend rot
7	Lamb.	**Herrenhausen,** Blume groß, vollgefüllt, reinweiß
5	G	**Hugonis,** Blüten einfach, leuchtendgelb
5	L	**Lutea bicolor,** Blume einfach, außen gelb, innen kapuzinerrot
5	G	**Moyesii,** Blume einfach, ca. 8 cm Durchmesser, tief scharlachrot
5	P	**multiflora grandiflora,** außerordentlich reichblühende, großblumige Form, reinweiß
5	Rug.	**Nowa Zembla,** reinweißer Sport von „Conrad Ferdinand Meyer"
5	G	**omeiensis pteracantha,** Stacheldrahtrose, auffallend durch die bis 3 cm breiten, roten Stacheln, stark aufrecht wachsend, Blume klein, reinweiß, im Mai
5	L	**Parkfeuer,** einfach, prachtvoll feurigrot
5	L	**Persian Yellow,** Blume groß, gefüllt, reingelb
5	G	**pimpinellifolia Stanwelliana perpetual,** Blume groß, gefüllt, blaßrosa
7	G	**Pteragonis,** Blume einfach, gelblichweiß, dicht an den Zweigen sitzend
5	Lamb.	**Rostock,** Blume groß, edelrosenähnlich, gut gefüllt, außen orangelachsrosa, innen hellgelb
5	G	**rubiginosa Bradwardine,** Form der schottischen Zaunrose, lebhaft rosa
5	G	**rubiginosa hybr. Rosenwunder,** Blume edelrosenähnlich, gut gefüllt, hellrot
5	G	**rubiginosa Lady Penzance,** Blume einfach, kupfriggelb, für sonnigen Standort
5	G	**rubiginosa Lucie Ashton,** Blume groß, frischrosa mit weißer Mitte
5	G	**rubiginosa magnifica,** Blume groß, halbgefüllt, leuchtendkarminrot mit goldgelben Staubfäden, duftend, vorzüglich auch für Hecken geeignet
5	G	**rubiginosa Refulgence,** sehr großblumig, halbgefüllt, leuchtend blutrot
5	M	**Salet,** Blume groß, gefüllt, rosa, remontierend
6	Lamb.	**Sangerhausen,** Blume groß, halbgefüllt, leuchtend feurigrot
5	Rug.	**Schneezwerg,** Blume klein, blendend weiß, in Dolden stehend
5	Lamb.	**Schwerin,** Blume groß, in Büscheln, gefüllt, feurig-blutrot
5	G	**setigera,** reichblühender, hochklimmender Strauch, Blume groß, rosenrot
6	G	**spinosissima hispida hybr. Frühlingsgold,** Blume einfach, enorm groß, rein goldgelb
5	Rug.	**Stern von Prag,** Blume groß, gefüllt, samtig schwärzlichrot
5	Lamb.	**Wilhelm,** Blume groß, gefüllt, leuchtend blutrot

Rosenneuheiten

der holsteinischer Rosenneuheitenzüchter können zu Originalpreisen durch mich bezogen werden.

Laubhölzer

Allee-, Solitär- und Zierbäume

Der Stammumfang ist auf 1 m Stammhöhe über dem Erdboden gemessen. Bei den mit „Hochstämmen" bezeichneten Bäumen beginnt die Krone durchweg 2—2,50—3 m über der Erde, je nach Stammstärke und Baumart. Bei Bäumen mit niedrigerer Stammhöhe (Halb- und Mittelstämmen) ist dieselbe jeweils angegeben.

Ein Stammumfang von:	entspricht einem Stammdurchmesser von:
6—8 cm	ca. 19—25 mm
8—10 „	„ 25—32 „
10—12 „	„ 32—38 „
12—14 „	„ 38—45 „
14—16 „	„ 45—51 „
16—18 „	„ 51—57 „
18—20 „	„ 57—64 „
20—22 „	„ 64—70 „
22—25 „	„ 70—80 „

Heister (baumartige Gehölze)

sind 2mal verpflanzt, stehen in weitem Stand und sind ihrer Art entsprechend verzweigt

Heckenpflanzen

und Sträucher, die sich für Hecken eignen, sind durch ein H bezeichnet. Seit Jahren ziehe ich regelmäßig große Mengen heran. **Für Lieferung einer in jeder Beziehung einwandfreien Ware, die überall freudig weiterwachsen muß, kann ich garantieren;** denn: der Boden wird sachgemäß vorbereitet, nur besonders geeignetes, ausgesuchtes Pflanzenmaterial wird zum Aufschulen verwendet, der Reihenabstand ist ausreichend bemessen, die Pflanzen werden mehrfach geschnitten und erforderlichenfalls an Stäben gezogen. Auch die größeren Pflanzen sind regelmäßig verschult worden und haben daher bestes Wurzelvermögen. Sämtliche Heckenpflanzen sind von unten an gut garniert und verzweigt.

Ziersträucher

werden in kräftigen 3—5jährigen Pflanzen geliefert soweit nicht stärkere oder jüngere Ware ausdrücklich gewünscht wird. Die Sträucher sind aus weitem Stand und verpflanzt. Die ungefähre Höhe der Sträucher ist angegeben.

Zeichenerklärung:

H = Heckenpflanzen oder für Hecken geeignete Sträucher
St = für Steingärten usw. geeignet
R = rauchharte Sträucher, für Industriegegenden besonders geeignet
S = für schattige Lage und als Unterholz geeignet
Tr = Trauerbaum
i = immergrünes Gehölz
B = Bienenweidepflanze

Ziersträucher und -Gehölze in einem guten Sortiment

nach meiner Wahl:	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
1. **Decksträucher, Ziersträucher, Vorsträucher** bis zur Preislage von RM. 53.— das Hundert	4.50	40.—	375.—
2. **Desgleichen,** bis zur Preislage von RM. 80.— das Hundert . .	6.—	53.—	480.—
3. **Buntblättrige Gehölze und Veredlungen** aus allen Preislagen .	7.25	66.—	600.—
4. **Baumartige Gehölze** aus allen Preislagen	10.—	93.—	840.—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acanthopanax pentaphyllus, Stachelkraftwurz,	H	80—100	0.55	5.—	—
Acer, Ahorn					
campestre, Feldahorn, mehrmals verpflanzte Büsche, geschnitten, gut garniert, aus weitem Stand, an Stäben gezogen. (Auf Wunsch kann auch eine Mittelqualität [20 % billiger] geliefert werden)	H,R,S	80—100	0.65	6.—	53.—
		100—125	0.80	7.30	67.—
		125—150	1.05	10.—	93.—
		150—175	1.30	12.—	113.—
		175—200	1.50	14.—	135.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.95	—	—
" "		10—12	3.65	—	—
" "		12—14	5.15	—	—
" "		18—20	12.—	—	—
dasycarpum, s. A. saccharinum					
ginnala	H,R	100—150	0.65	6.—	53.—
		150—200	0.80	7.30	67.—
negundo, Eschenahorn		150—250	0.65	6.—	53.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.—	—	—
negundo argenteo - variegatum, weißbuntblättriger Eschenahorn		100—150	1.35	12.50	120.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.10	29.50	—
" "		10—12	4.—	36.—	—
negundo aureo-marginatum, Blätter gelb gerandet		80—100	1.35	12.50	—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.50	—	—
negundo odessanum, Belaubung goldgelb		80—100	1.35	12.50	—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.10	—	—
" "		10—12	4.—	36.—	—
palmatum, japanischer Fächerahorn	H,S	60—80	0.80	7.30	67.—
palmatum atropurpureum mit Ballen	H	40—60	4.—	36.—	—
" "		60—80	5.30	48.—	—
" "		80—100	5.85	53.—	—
" "		100—125	7.—	—	—
palmatum dissectum atropurpureum, mit Ballen, Breite	St	40—60	5.30	48.—	—
" " "		60—80	6.50	60.—	—
palmatum dissectum rubrifolium mit Ballen, Breite	St	40—60	5.30	48.—	—
" " "		60—80	6.50	60.—	—
palmatum dissectum viridis mit Ballen, Breite	St	40—60	5.30	48.—	—
" " "		60—80	6.50	60.—	—
" " "		80—100	8.—	—	—
platanoides, Spitzahorn	B	150—200	0.70	6.50	60.—
		200—300	0.90	8.50	80.—
		300—400	1.20	11.50	105.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	1.80	16.50	150.—
" "		10—12	2.40	22.—	200.—
" "		12—14	3.—	27.50	250.—
" "		14—16	3.35	32.—	—
Hochstämme, verpflanzt		12—14	4.25	40.50	—
" "		14—16	5.55	53.—	—
" "		16—18	7.—	65.—	—
platanoides globosum, Kugelahorn,					
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.45	23.—	220.—
" "		10—12	3.10	29.50	—
" "		12—14	4.—	38.—	—
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		14—16	8.—	—	—
platanoides Schwedleri		200—300	1.60	15.—	—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.—	27.50	250.—
" "		10—12	4.—	36.—	325.—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer (Fortsetzung)					
pseudoplatanus, Weiß- oder Bergahorn	B	200—300	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	1.80	16.50	150.—
,, ,,		10—12	2.50	22.50	200.—
Hochstämme, verpflanzt		16—18	7.20	68.50	—
,, ,,		18—20	8.80	84.—	—
,, ,,		20—24	12.—	115.—	—
pseudoplatanus purpurascens,					
Hochstämme, Stammumfang		8—10	1.80	16.50	—
,, ,,		10—12	2.40	22.—	—
Hochstämme, verpflanzt		18—20	8.80	—	—
saccharinum (A. dasycarpum), Silberahorn . . .	B	150—200	0.90	8.50	—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.—	19.—	180.—
,, ,,		10—12	2.45	23.—	—
Hochstämme, verpflanzt		12—14	4.40	42.—	—
,, ,,		14—16	6.50	62.50	—
,, ,,		16—18	8.—	—	—
saccharinum Wieri . . Hochstämme, Stammumfang		7—8	2.65	24.—	—
tatarícum, tatarischer Ahorn	H,R,S	150—200	0.70	6.50	60.—
Aesculus, Kastanie					
carnea (A. rubicunda), rotblühende Kastanie . .	B	125—175	1.50	14.—	135.—
Hochstämme mit 1—2jähriger Krone, Stammumfang		8—10	4.15	39.50	375.—
,, ,, 1—2 ,, ,, ,,		10—12	5.15	49.—	465.—
,, ,, 1—2 ,, ,, ,,		12—14	5.90	56.—	535.—
Hochstämme, verpflanzt		14—16	8.—	75.—	—
,, ,,		16—18	9.50	87.—	—
,, ,,		18—20	11.—	105.—	—
hippocastanum, Roßkastanie	B	100—150	0.60	5.20	47.—
		150—200	0.70	6.50	60.—
		200—250	1.—	9.50	87.—
		250—300	1.65	15.—	135.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.40	22.—	200.—
,, ,,		10—12	3.—	27.50	250.—
,, ,,		12—14	3.60	33.—	300.—
,, ,,		14—16	4.40	42.—	400.—
Hochstämme, verpflanzt		14—16	6.50	62.50	600.—
,, ,,		16—18	8.80	84.—	—
,, ,,		18—20	11.—	105.—	—
,, ,,		20—25	14.—	135.—	—
,, ,,		25—30	18.—	175.—	—
,, ,,		30—35	22.—	215.—	—
,, ,,		40—50	43.—	—	—
hippocastanum flore pleno, weißgefüllt blühend					
Hochstämme mit 1—2jähriger Krone, Stammumfang		8—10	3.—	27.50	250.—
,, ,, 1—2 ,, ,, ,,		10—12	4.—	36.—	325.—
,, ,, 1—2 ,, ,, ,,		12—14	4.80	44.—	400.—
,, ,, 1—2 ,, ,, ,,		14—16	5.50	52.50	500.—
Hochstämme, verpflanzt		14—16	8.—	75.—	—
,, ,,		16—18	10.—	95.—	—
,, ,,		24—28	20.—	—	—
,, ,,		28—32	27.—	—	—
parviflora (A. macrostachya)	B	80—125	1.35	12.50	—
rubicunda, siehe A. carnea					
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	R,B	80—120	0.60	5.20	47.—
		200—250	0.80	7.30	67.—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Alnus, Erle					
glutinosa, Roterle	S,B	125—175	0.60	5.20	47.—
		175—250	0.70	6.50	60.—
		250—350	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.20	20.—	180.—
" "		10—12	2.40	22.—	200.—
" "		12—14	2.95	28.—	265.—
incana, Weißerle	S,B	125—175	0.60	5.20	47.—
		175—250	0.70	6.50	60.—
		250—350	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		10—12	2.40	22.—	200.—
" "		12—14	2.95	28.—	265.—
incana aurea	B	80—120	1.20	—	—
		150—200	1.80	—	—
Amelanchier, Felsenbirne					
canadensis	R,S,B	60—80	0.60	5.20	47.—
		100—150	0.70	6.50	60.—
vulgaris (A. rotundifolia)	R,S,B	60—80	0.60	5.20	—
Amorpha fruticosa, Bastardindigo	B	100—150	0.50	4.50	40.—
Ampelopsis, siehe Parthenocissus unter „Schlingpflanzen"					
Andromeda, Lavendelheide					
Catesbaei, siehe Leucothoe Catesbaei					
floribunda	S, i	40—60	2.90	26.50	—
japonica	R,S,i	30—40	1.95	17.50	—
		40—60	2.90	26.50	—
Aralia chinensis mandschurica, Aralie		100—150	1.35	—	—
Arctostaphylos, Bärentraube					
nevadensis mit Topfballen	St, i	—	1.—	9.—	—
uva-ursi mit Topfballen	St, i	—	1.—	9.—	—
Aristolochia, siehe „Schlingpflanzen"					
Aronia floribunda, Apfelbeere, Zwergvogelbeere		60—80	0.50	4.50	—
Artemisia abrotanum, Beifuß		60—80	0.50	4.50	—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Azalea, Azalee, Felsenstrauch					
japonica, in verschiedenen Sorten und Farben	St	20—30	2.65	24.—	—
		30—40	3.20	29.—	—
		40—50	4.—	36.—	—
mollis, mit Knospen gut besetzte Pflanzen		20—30	1.20	11.—	100.—
		30—40	1.70	15.—	135.—
		40—50	2.50	22.50	200.—
		50—60	3.25	28.—	250.—
pontica, mit Knospen gut besetzte Pflanzen		20—30	1.20	11.—	100.—
		30—40	1.70	15.—	—
		40—50	2.50	22.50	—
		50—60	3.25	28.—	—
		60—70	4.10	—	—
mollis- und pontica-Hybriden, in veredelten Sorten und verschiedenen Farben, mit Knospen gut besetzte Pflanzen		30—40	2.90	26.50	240.—
		40—50	3.20	29.—	265.—
		50—60	3.85	35.—	320.—
		60—70	5.50	50.—	—
Vuykiana, in verschiedenen Sorten und Farben		30—40	4.—	36.—	—
Berberis, Berberitze					
aggregata	H, B	40—60	0.45	4.—	33.—
		60—80	0.50	4.50	40.—
brevipaniculata	B	50—70	0.50	4.50	40.—
buxifolia nana	H, St, S, i	15—25	0.45	4.—	33.—
candidula mit Ballen	St, S, i	30—40	2.—	18.—	160.—
" "		40—60	2.65	24.—	—
Gagnepainii mit Ballen	St, S, i, B	30—40	2.—	18.—	—
" "		40—60	2.65	24.—	—
Julianae mit Ballen	S, i, B	30—40	1.80	16.—	—
" "		40—60	2.—	18.—	—
Neubertii mit Ballen	S, i, B	80—100	1.20	—	—
sinensis	B	70—100	0.50	4.50	—
stenophylla mit Ballen	H, S, i, B	40—60	2.20	20.—	—
" "		60—80	2.65	24.—	—
Thunbergii	H, B	30—40	0.45	4.—	33.—
		40—60	0.50	4.50	40.—
		60—80	0.60	5.20	47.—
Thunbergii atropurpurea	H, B	30—40	0.60	5.20	47.—
		40—60	0.70	6.50	60.—
		60—80	0.90	8.50	80.—
verruculosa mit Ballen	St, S, i, B	30—40	2.—	18.—	—
" "		40—60	2.65	24.—	—
vulgaris	H, R, B	60—100	0.50	4.50	40.—
vulg. atropurpurea	H, B	60—100	0.50	4.50	40.—
Wilsonae mit Ballen	H, St, i, B	40—60	1.—	9.—	—
" "		60—80	1.35	12.—	—
Betula, Birke					
lutea, Gelbbirke		125—175	0.60	5.20	47.—
nana, Zwergbirke mit Ballen	St	40—60	2.—	18.—	—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Betula (Fortsetzung)					
papyrifera (B. papyracea), Papierbirke	R	150—200	0.90	8.50	—
		200—250	1.35	12.50	—
		250—300	1.95	18.—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—8	1.80	17.—	—
pubescens, Moorbirke	H,R	125—150	0.70	6.50	60.—
		150—200	0.90	8.50	80.—
		200—250	1.35	12.50	120.—
		250—300	1.95	18.—	175.—
		300—350	2.65	25.50	—
Hochstämme, Stammumfang		7—8	1.80	17.—	160.—
" "		8—10	2.20	21.—	200.—
Hochstämme, mit Erdballen		8—10	2.90	26.50	240.—
" " "		10—12	4.—	36.50	—
verrucosa (B. alba)	R	125—150	0.70	6.50	60.—
		150—200	0.90	8.50	80.—
		200—250	1.35	12.50	120.—
		250—300	1.95	18.—	175.—
		300—350	2.65	25.50	—
Breite Heister mit Ballen		400—500	7.—	65.—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—8	1.80	17.—	160.—
" "		8—10	2.20	21.—	200.—
Hochstämme, mit Erdballen		8—10	2.90	26.50	240.—
" " "		10—12	4.—	36.50	—
" " "		12—14	5.50	50.—	—
" " "		14—16	7.—	65.—	—
" " "		16—18	8.50	80.—	—
verrucosa atropurpurea, Blutbirke mit Ballen	R	200—250	4.—	36.—	—
" "		250—300	5.30	48.—	—
verrucosa fastigiata mit Ballen	R	200—250	4.—	36.—	—
" "		250—300	5.30	48.—	—
" "		300—400	6.50	60.—	—
Hochstämme, mit Erdballen		7—8	6.50	60.—	—
" " "		8—10	8.—	75.—	—
verrucosa laciniata mit Ballen	R	150—200	3.30	30.—	—
" "		200—250	4.—	36.—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang		8—10	7.—	65.—	—
verrucosa pendula Youngii mit Erdballen	R,Tr	200—250	5.30	48.—	440.—
" "		250—300	6.50	60.—	535.—
Halbstämme, Stammumfang		6—7	5.30	48.—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang		7—8	6.50	60.—	—
" " " "		8—10	8.—	75.—	—
verrucosa tristis mit Erdballen	R,Tr	200—250	5.30	48.—	—
" "		250—300	6.50	60.—	—
" "		300—350	8.—	—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang		7—8	6.50	60.—	—
" " " "		8—10	8.—	75.—	—
" " " "		10—12	9.20	87.—	—
" " " "		12—14	10.50	100.—	—
" " " "		16—18	13.50	—	—
Buddleia, Buddleie					
albiflora (B. Hemsleyana)		80—120	0.65	6.—	53.—
alternifolia mit Ballen		30—40	1.20	11.—	—
Davidii (B. variabilis)		80—120	0.65	6.—	53.—
Davidii Ile de France mit Ballen		30—40	2.20	20.—	—
Davidii magnifica		100—150	0.65	6.—	53.—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Betula (Fortsetzung)					
Davidii nanhoensis		100—150	0.65	6.—	53.—
Davidii Veitchiana		100—150	0.65	6.—	53.—
Buxus, Buchsbaum					
sempervirens (B. arborescens), baumartiger Buchsbaum	H,S, i,B				
Geschnittene Büsche (Heckenpflanzen), mit Ballen 15—20 cm breit		30—40	0.80	7.—	60.—
20—30 cm breit		40—50	1.—	9.—	80.—
Mehrmals verpflanzte Büsche, ohne Ballen 8—12 cm breit 1000 St. RM. 215.—		15—20	0.35	2.70	24.—
10—15 „ „ 1000 „ „ 265.—		20—25	0.40	3.30	29.50
12—16 „ „ 1000 „ „ 300.—		25—30	0.45	4.—	33.—
Geschnittene Kugeln, Breite wie Höhe		25—30	2.40	22.—	—
		30—35	2.90	26.50	—
		35—40	4.—	36.50	—
		70—80	9.20	—	—
Geschnittene Pyramiden		60—70	Eigene Bestände erfroren, für Auslandsware zur Lieferung Frühjahr 1941 Preise auf Anfrage		
		70—80			
		80—90			
		90—100			
		100—120			
sempervirens Handsworthii	H,i,B	20—25	0.65	6.—	—
Calluna, Heidekraut					
vulgaris	St,i,B	—	0.35	2.70	20.—
vulg. alba	St,i,B	—	0.45	4.—	33.—
vulg. Alportii	St,i,B	—	0.50	4.50	40.—
vulg. argentea	St,i,B	—	0.45	4.—	—
vulg. aurea	St,i,B	—	0.50	4.50	—
vulg. cuprea	St,i,B	—	0.50	4.50	—
vulg. elegantissima	St,i,B	—	0.45	4.—	33.—
vulg. erecta alba	St,i,B	—	0.45	4.—	33.—
vulg. flore albo pleno	St,i,B	—	0.65	6.—	53.—
vulg. flore pleno	St,i,B	—	0.60	5.20	47.—
vulg. Hammondii	St,i,B	—	0.45	4.—	—
vulg. nana (C. vulg. minima)	St,i,B	—	0.45	4.—	33.—
vulg. Searlei	St,i,B	—	0.50	4.50	40.—
vulg. spicata	St,i,B	—	0.50	4.50	40.—
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	R	40—60	1.35	12.50	120.—
		60—80	1.50	14.—	135.—
		80—100	1.80	17.—	—
Campsis (Tecoma, Bignonia), siehe „Schlingpfl."					

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	H	80—120	0.45	4.—	33.—
		125—175	0.50	4.50	40.—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	1.35	12.50	—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	1.80	17.—	160.—
arborescens pendula, Trauererbsenbaum,	Tr				
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	2.—	19.—	—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.90	26.50	—
" "		10—12	4.—	36.—	—
Carpinus, Weiß- oder Hainbuche					
betulus	H,R,S				
Ungeschnittene, vollgarnierte Pyramiden, mit festen Ballen, Solitärpflanzen		500—600	20.—	—	—
Ungeschnittene Büsche, mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand		80—125	0.70	6.50	60.—
Heckenpflanzen:					
3mal verpflanzte Ballenware, mit besonders guter		150—175	2.25	20.50	185.—
		175—200	2.90	26.50	240.—
Garnierung, aus weitem Stand		200—225	3.65	33.50	305.—
		225—250	4.50	41.—	375.—
		250—300	6.—	55.—	500.—
		300—350	5.30	48.—	—
		350—400	6.50	60.—	—
Mehrmals verpflanzt, regelmäßig geschnitten, aus		80—100	0.85	8.—	73.—
weitem Stand, I. Qualität, gut garniert, mit bester		100—125	1.05	10.—	93.—
		125—150	1.35	12.50	120.—
Bewurzelung und möglichst geradem Mitteltrieb (werden auf Wunsch zu 5—10 Stück gebündelt, in Moos und Emballierleinen eingebunden geliefert)		150—175	1.80	17.—	160.—
		175—200	2.20	21.—	200.—
		200—225	2.70	26.—	245.—
		225—250	3.30	31.50	—
Auf Wunsch kann eine mittlere Qualität 20 % billiger als die I. Qualität geliefert werden; jüngere 1mal verschulte Pflanzen, siehe „Junggehölze"					
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang		12—14	6.40	—	—
" " " "		14—16	8.—	—	—
" " " "		16—20	9.20	—	—
betulus pyramidalis, Pyramidenweißbuche, mit Ballen	H,R,S	150—200	2.90	26.50	—
		200—250	4.40	40.—	—
		250—300	6.—	55.—	—
		300—350	8.25	—	—
		350—400	12.—	—	—
Castanea sativa (C. vesca), echte Kastanie . . .	R	80—120	0.80	7.30	67.—
Catalpa, Trompetenbaum					
bignonioides (C. syringifolia)	R,B	80—100	0.70	6.50	60.—
		100—150	1.05	10.—	93.—
Hochstämme, Stammumfang		10—12	4.20	—	—
" "		12—14	6.—	—	—
speciosa	R,B	80—100	0.70	6.50	60.—
		100—150	1.05	10.—	93.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.55	33.50	—
" "		10—12	4.20	40.—	—
" "		12—14	6.—	57.—	—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ceanothus, Säckelblume	St				
americanus		60—80	0.65	6.—	53.—
azureus		60—100	1.75	16.—	145.—
Chaenomeles (Cydonia), Scheinquitte, japanische Quitte					
japonica (Ch. Maulei)	H, St, R, B	50—70	0.50	4.50	40.—
lagenaria (Ch. japonica)	H, R, B	60—80	0.50	4.50	40.—
lagenaria alba	B	60—80	0.65	6.—	53.—
lagenaria atricoccinea	B	60—80	0.85	8.—	—
lagenaria atricoccinea plena	B	60—80	0.85	8.—	—
lagenaria eximia	B	60—80	0.65	6.—	—
lagenaria Gaujardii	B	60—100	0.65	6.—	—
lagenaria sanguinea plena	B	60—80	0.85	8.—	—
lagenaria umbilicata	B	60—100	0.65	6.—	53.—
Chionanthus virginica, Schneeflockenbaum,					
mit Ballen		40—60	1.80	16.—	—
" "		60—80	2.20	20.—	—
		80—120	2.90	26.50	—
Clematis, siehe „Schlingpflanzen"					
Colutea arborescens, Blasenstrauch	R, B	100—150	0.50	4.50	40.—
Cornus, Hartriegel, Kornelkirsche					
alba	R, S	125—175	0.50	4.50	40.—
alba albo-marginata elegans		80—100	0.70	—	—
alba argenteo-marginata		80—100	0.70	6.50	60.—
alba flaviramea	S	100—120	0.65	6.—	53.—
alba Gouchaultii		80—100	0.70	6.50	60.—
alba Kesselringii	S	100—120	0.50	4.50	40.—
alba sibirica (C. tatarica sibirica)	R, S	100—120	0.70	6.50	60.—
alba Spaethii		80—100	0.70	6.50	60.—
florida mit Ballen		60—80	2.20	—	—
mas	H, R, S, B	60—80	0.70	6.50	60.—
		80—100	0.85	8.—	73.—
Halbstämme, Stammhöhe		130—150	1.80	17.—	160.—
sanguinea	H, R, S	100—120	0.50	4.50	40.—
tatarica sibirica, siehe Cornus alba sibirica					
Corylopsis pauciflora, Scheinhasel, mit Ballen	St	40—60	4.30	—	—
Corylus, Haselnuß					
avellana, gemeine Haselnuß	H, R, S, B	60—80	0.60	5.20	47.—
		80—100	0.70	6.50	60.—
		100—150	0.85	8.—	73.—
		150—200	0.90	8.50	80.—
avellana atropupurea, Bluthasel	H, B, S	60—80	1.20	11.50	105.—
		80—100	1.50	14.—	—
avellana Rotblättrige Zellernuß	H, B, S	60—80	1.20	11.50	105.—
		80—120	1.50	14.—	135.—
avellana aurea	H, S, B	80—120	1.60	15.—	—
avellana laciniata	R, S	80—120	1.60	15.—	—
colurna, Baumhasel	R	200—300	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.—	27.50	250.—
" "		10—12	3.55	33.50	320.—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Cotinus, Perückenstrauch					
coggygria (Rhus cotinus)		40—60	1.15	10.50	—
coggygria rubrifolia		80—100	1.80	17.—	—
Cotoneaster, Zwergmispel					
acutifolia	H,R,B	60—80	0.50	4.50	40.—
adpressa mit Ballen	St, i,B	30—40	1.60	15.—	—
" "		40—60	1.85	16.50	—
applanata, siehe C. Dielsiana					
bullata	H, B	80—120	0.50	4.50	40.—
Dammeri (C. humifusa) mit Ballen, Breite	St, i, S	20—30	1.50	13.50	120.—
" " "		30—40	1.95	17.50	160.—
" " "		40—60	2.20	20.—	—
Dielsiana (C. applanata)	H, B	80—100	0.50	4.50	40.—
divaricata	St, B	80—100	0.50	4.50	40.—
Franchetii mit Ballen	H,St, i	30—50	1.—	9.—	—
horizontalis mit Ballen, Breite	St, R,	20—30	0.95	8.—	73.—
" " "	i, S, B	30—40	1.15	10.50	93.—
" " "		40—60	1.65	15.—	135.—
" " "		60—80	2.40	22.—	200.—
horizontalis perpusilla mit Ballen, Breite		20—30	0.95	8.—	—
humifusa, siehe C. Dammeri					
lactea mit Ballen	St, B	60—80	2.40	—	—
moupinensis	H, B	60—100	0.50	4.50	40.—
multiflora	H, B	60—100	0.60	5.50	—
praecox mit Ballen, Breite	St, B	20—30	1.—	9.—	—
" " "		30—40	1.30	11.50	105.—
" " "		40—60	1.65	15.—	130.—
prostrata mit Ballen, Breite	St, i,B	30—40	1.15	10.50	—
" " "		40—60	1.60	15.—	—
salicifolia floccosa mit Ballen	St, i	40—60	2.15	19.50	—
Simonsii	H, St, i, B	40—60	0.50	4.50	—
Crataegus, Dorn					
Carrierei	R	80—120	0.70	6.50	60.—
		150—200	0.90	8.50	80.—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	1.60	15.—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—8	2.—	19.—	—
" "		8—10	2.20	21.—	—
coccinea, Scharlachdorn	H,R,B	80—100	0.70	6.50	60.—
		150—200	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		10—12	2.65	25.50	—
monogyna, Weißdorn, verpfl. Sträucher	H, R,				
(Jüngere [2—4j.] Heckenpflanzen, siehe „Junggehölze")	S, B	80—125	0.50	4.50	40.—
monogyna albo-plena, gefülltblühender Weißdorn	R, B	125—175	1.20	11.50	—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	1.60	15.—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—8	2.65	25.50	—
" "		8—10	3.30	31.50	—
monogyna kermesina plena, Rotdorn	H,R,B	100—150	1.—	9.50	87.—
		150—200	1.20	11.50	105.—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	1.50	14.—	135.—
Hochstämme, Stammumfang		7—8	2.—	19.—	—
" "		8—10	2.45	23.—	—
" "		10—12	3.10	—	—
prunifolia	H, R	150—200	0.90	8.50	80.—
sanguinea	H, R	60—80	0.60	5.20	47.—
		150—200	0.85	8.—	73.—
Hochstämme, Stammumfang		12—14	3.10	28.—	—
Cydonia, siehe Chaenomeles					
Cytisus, Geißklee, Strauchgoldregen					
kewensis mit Ballen	St, B	30—40	2.65	24.—	—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Cytisus (Fortsetzung)					
laburnum, siehe Laburnum vulgare					
nigricans, starke 1jährige Sämlinge mit Topfballen	St,B	30—50	0.60	5.20	47.—
praecox . . . . . mit Ballen	St,B	40—60	1.30	11.50	105.—
" "		60—80	1.95	17.50	160.—
purpureus . . . . . mit Ballen	St	40—60	1.30	11.50	105.—
scoparius (Genista scoparia) . . . mit Topfballen	St,B	20—40	0.45	4.—	33.—
" "		40—70	0.60	5.20	47.—
scoparius in veredelten Sorten: Dallimorei, Dorothy Walpole, scop. Andreanus, scop. Firefly, scop. Mayfly, scop. pendulus, mit Ballen	St,B	30—60	2.20	20.—	—
Daphne, Seidelbast					
cneorum . . . . . mit Ballen	St,R,i	20—30	2.65	24.—	—
mezereum rubra . . . . . mit Ballen	St,R,S	30—40	1.80	16.—	—
		40—60	2.20	20.—	—
" "		60—80	2.55	23.50	—
mezereum alba . . . . . mit Ballen	St,R,S	40—60	2.20	20.—	—
Decaisnea Fargesii		100—125	1.35	—	—
Deutzia, Deutzie					
I. Hochwachsende Sorten:	H				
crenata-Formen, siehe D. scabra-Formen					
magnifica		100—150	0.50	4.50	40.—
scabra candidissima		100—150	0.50	4.50	40.—
scabra macrothyrsa		100—150	0.60	5.20	47.—
scabra Pride of Rochester		100—150	0.50	4.50	40.—
scabra rosea plena		100—150	0.50	4.50	40.—
scabra Watereri		100—150	0.50	4.50	40.—
II. Niedrige Sorten:	H,St				
elegantissima fasciculata		40—60	0.50	4.50	—
gracilis		30—50	0.50	4.50	40.—
kalmiaeflora		30—50	0.50	4.50	40.—
Lemoinei		60—80	0.50	4.50	40.—
Lem. Boule rose		60—80	0.50	4.50	—
Lem. compacta		40—60	0.50	4.50	40.—
Lem. comp. Avalanche		40—60	0.50	4.50	40.—
Lem. comp. Boule de neige		60—80	0.50	4.50	40.—
purpurascens (D. discolor purpurascens) . . .		40—60	0.50	4.50	40.—
rosea (D. gracilis rosea)		60—80	0.50	4.50	40.—
rosea campanulata		40—60	0.50	4.50	40.—
rosea carminea		40—60	0.50	4.50	40.—
rosea eximia		40—60	0.50	4.50	40.—
rosea grandiflora (D. discolor grandiflora) . . .		40—60	0.50	4.50	40.—
rosea multiflora (D. gracilis multiflora) . . .		40—60	0.50	4.50	40.—
rosea venusta		40—60	0.50	4.50	40.—
Diervilla (Weigela), Weigelie	S				
candida		80—100	0.65	6.—	—
Chamaeleon		80—100	0.65	6.—	—
coraeensis (D. amabilis)		80—100	0.65	6.—	53.—
Eva Rathke		50—80	0.80	7.30	67.—
		80—120	1.05	10.—	93.—
floribunda		80—100	0.65	—	—
florida (D. rosea)		80—100	0.65	6.—	53.—
florida alba (D. amabilis alba)		80—100	0.65	6.—	—
florida variegata (D. rosea variegata)		40—60	0.70	6.50	60.—
Groenewegii		80—100	0.65	6.—	53.—
intermedia Stelzneri		80—100	0.65	6.—	53.—
japonica		80—100	0.70	6.50	—
Mme. Couturier		80—100	0.65	6.—	53.—
praecox Bouquet rose		80—100	0.65	—	—
Président Duchartre		60—80	0.70	6.50	—
styriaca		80—100	0.65	6.—	—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Diervilla (Fortsetzung)					
van Houttei		80—100	0.65	6.—	53.—
venosa		80—100	0.65	6.—	53.—
Verschaffeltii		80—100	0.65	6.—	53.—
Elaeagnus, Oelweide					
angustifolia	H,R	125—175	0.65	6.—	53.—
argentea	R	100—125	0.70	6.50	60.—
multiflora (E. edulis)		60—80	0.70	6.50	—
Enkianthus campanulatus, Prachtglocke, mit Ballen	St	60—80	2.20	20.—	—
Erica, Schneeheide	H,St,				
carnea (E. herbaceae)	i,B	—	0.50	4.50	40.—
carnea alba		—	0.60	5.20	47.—
carnea atropurpurea		—	0.60	5.20	47.—
carnea James Backhouse		—	0.60	5.20	47.—
carnea Vivellii		—	0.60	5.20	47.—
carnea Winter Beauty		—	0.60	5.20	47.—
mediterranea		—	0.50	4.50	40.—
Extra starke Pflanzen		—	0.65	6.—	53.—
vagans alba		—	0.60	5.50	—
vagans carnea		—	0.60	5.50	—
vagans Lyonesse		—	0.60	5.50	—
vagans Mrs. D. F. Maxwell		—	0.70	6.50	—
vulgaris und — Formen, siehe Calluna vulgaris					
Evonymus, Spindelbaum					
alata mit Ballen	St	40—60	0.90	8.—	—
europaea	H,R,S	80—120	0.65	6.—	53.—
nana Koopmannii mit Ballen	St,R,	30—40	0.60	5.20	47.—
" "	S,	40—60	0.65	6.—	53.—
radicans mit Ballen	H,St,	20—30	0.50	4.50	40.—
" "	S,i	30—40	0.60	5.20	47.—
" "		40—60	0.65	6.—	53.—
radicans argenteo-variegata mit Ballen	H,St,	20—30	0.60	5.50	—
" "	S,i	30—40	0.65	6.—	—
radicans vegeta mit Ballen, Breite	St,S,i	30—40	1.—	9.—	80.—
" " "		40—60	1.30	11.50	105.—
" " "		60—80	2.25	20.50	180.—
Exochorda grandiflora, Scheinfelsenbirne		80—120	0.90	8.50	—
Fagus, Buche					
silvatica, Rotbuche, mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, I. Qualität mit bester Bewurzelung, gut-garniert, mit möglichst geradem Mitteltrieb (werden auf Wunsch zu 5—10 Stück gebündelt, in Moos und Emballierleinen eingebunden, geliefert)	H,R,B	80—100	0.85	8.—	73.—
		100—125	1.05	10.—	93.—
		125—150	1.35	12.50	120.—
		150—175	1.80	17.—	160.—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang		20—24	21.50	—	—
silvatica fastigiata mit Ballen		80—100	2.90	26.50	—
silvatica purpurea, Blutbuche, rotblättrige, aus Samen gezogene Pflanzen Pyramiden mit Ballen	H,R,B	80—100	1.30	11.50	105.—
		100—125	1.65	15.—	135.—
" " "		125—150	2.40	22.—	200.—
" " "		150—175	2.90	26.50	240.—
" " "		200—250	4.30	40.—	365.—
" " "		250—300	5.60	51.—	465.—
" " "		300—350	10.50	100.—	935.—
" " "		350—400	16.—	150.—	1450.—
" " "		400—450	18.—	175.—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang		8—10	6.50	60.—	—
" " " "		10—12	8.—	75.—	—
" " " "		12—14	10.—	95.—	—
" " " "		14—16	11.50	110.—	—
" " " "		16—18	13.50	130.—	—
" " " "		44—48	auf	An-	frage!

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Fagus (Fortsetzung)					
silvatica purpurea macrophylla, veredelte Blutbuche, Pyramiden mit Ballen	H, R	125—150	3.20	29.—	—
" " "		150—175	4.30	40.—	—
" " "		175—200	5.50	50.—	—
" " "		200—250	7.—	65.—	—
" " "		250—300	8.50	—	—
" " "		300—350	13.50	—	—
" " "		350—400	17.50	—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang		8—10	9.50	87.—	—
" " " "		10—12	10.50	100.—	—
" " " "		12—14	12.50	120.—	—
silvatica pendula, grünblättrige Trauerbuche, von unten an garniert, mit geradem Mitteltrieb, mit Ballen	R, Tr	150—175	4.—	36.—	—
		175—200	4.40	40.—	—
		200—250	5.30	48.—	—
" "		250—300	6.50	60.—	—
" "		300—400	8.50	80.—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang		8—10	10.50	100.—	—
" " " "		10—12	12.50	120.—	—
silvatica purpurea pendula, Trauerblutbuche, von unten an garniert, mit geradem Mitteltrieb, mit Ballen	R, Tr	125—150	6.50	60.—	—
		150—175	8.—	75.—	—
		175—200	9.50	87.—	—
" "		200—250	10.50	100.—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang		8—10	20.—	190.—	—
" " " "		10—12	24.—	215.—	—
Fontanesia phillyraeoides, Fontanesie	S	60—80	0.50	4.50	—
Forsythia, Forsythie					
intermedia	H, B	100—150	0.60	5.20	47.—
intermedia densiflora	B	100—150	0.60	5.20	47.—
intermedia spectabilis	H, B	100—150	0.60	5.20	47.—
intermedia vitellina	H, B	100—150	0.60	5.20	47.—
suspensa	B	60—100	0.65	6.—	—
suspensa Fortunei	B	80—120	0.65	6.—	53.—
suspensa Sieboldii	B	100—150	0.65	6.—	53.—
viridissima	H, S, B	60—100	0.60	5.20	47.—
Fraxinus, Esche					
excelsior, gemeine Esche	R	150—200	0.65	6.—	53.—
		200—300	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		12—14	2.40	22.—	200.—
" "		14—16	2.95	28.—	265.—
excelsior globosa, Kugelesche	R				
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.95	28.—	—
" "		10—12	3.65	35.—	—
excelsior pendula, Traueresche	R, Tr				
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.55	33.50	—
" "		10—12	4.20	40.—	—
" "		12—14	5.10	47.—	—
" "		14—16	6.—	—	—
" "		16—20	6.50	—	—
ornus, gem. Blumenesche	R, B	80—120	0.70	6.50	60.—
Gaultheria, Scheinbeere					
procumbens	St, S, i	—	1.20	11.—	—
shallon	St, S, i	—	1.20	11.—	—
Genista, Ginster					
praecox, siehe Cytisus praecox					
scoparia und veredelte Formen, siehe Cytisus scoparius					
tinctoria	St	40—60	0.45	4.—	33.—
starke 1jährige Sämlinge mit Topfballen		20—40	0.45	4.—	33.—
tinctoria plena mit Topfballen	St	30—40	1.20	11.50	105.—
Ginkgo biloba, Fächerbaum, Ginkgobaum, siehe „Koniferen"					

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Gleditschia triacanthos, Christusdorn	H, R	80—100	0.60	5.20	47.—
		200—300	1.10	10.—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—8	4.50	42.50	400.—
Glycine (Wistaria), siehe „Schlingpflanzen"					
Hamamelis, Zaubernuß,					
japonica . . . . . mit Ballen		60—80	4.—	36.—	—
" "		80—100	4.40	—	—
" "		150—200	12.—	—	—
japonica rubra . . . . . mit Ballen		60—80	4.—	36.—	—
" "		80—100	4.40	40.—	—
" "		150—175	12.—	—	—
mollis . . . . . mit Ballen		60—80	4.—	36.—	—
" "		80—100	4.40	40.—	—
" "		100—125	5.85	53.—	—
" "		125—150	8.50	80.—	—
" "		150—200	12.—	—	—
virginiana . . . . . mit Ballen		80—100	1.35	12.—	—
" "		100—125	1.80	16.—	—
" "		125—150	2.20	20.—	—
" "		150—200	2.65	24.—	—
Hedera, Efeu					
helix und **helix hibernica**, siehe „Schlingpflanzen"					
helix conglomerata, Felsen-Efeu . . . mit Ballen	St	15—20	1.—	—	—
Hibiscus syriacus-Hybriden, Eibisch,	St				
in folgenden Sorten: **Admiral Dewey, ardens, coelestis, Comte de Flandre, elegantissimus, Jeanne d'Arc, pulcherrimus, puniceus plenus, ranunculiflorus albus plenus, Rubin, Souv. de Charles Breton** . . .		40—70	1.—	9.—	80.—
		60—100	1.30	12.—	—
Hippophaes rhamnoides, Sanddorn	H	80—100	0.50	4.50	40.—
		100—150	0.60	5.20	47.—
Holodiscus discolor ariaefolius (Spiraea ariaefolia), Scheinspiere	H,S,B	60—80	0.50	4.50	—
Hydrangea, Hortensie					
arborescens grandiflora	S	60—80	0.70	—	—
opuloides acuminata		—	1.20	—	—
paniculata grandiflora, bekannte Gartenhortensie,					
Sträucher mit 3—5 Trieben		40—60	0.45	4.15	37.50
" " 5—8 "		50—80	0.70	6.50	60.—
Sträucher, extra stark, zum Treiben		50—80	0.85	8.—	—
Halbstämme, Stammhöhe		80—100	2.10	19.50	185.—
petiolaris, siehe „Schlingpflanzen"					
Hypericum, Johannisstrauch, Hartheu					
calycinum	St, S, i	30—40	0.90	8.50	—
Moserianum	St, S	30—40	1.—	9.—	—
patulum Henryi	St, S	40—60	0.70	6.50	60.—
Ilex, Stechpalme, Hülse					
aquifolium	H, St, R, S, i	60—80	Eigene Bestände erfroren, Auslandsware zur Lieferung Frühjahr 1941 – Preise auf Anfrage		
		80—100			
		100—125			
aquifolium pyramidalis	H, St, R, S, i	60—80			
		80—100			
		100—125			
Gelbbuntblättriger Ilex	St, i	40—60	3.65	—	—
Weißbuntblättriger Ilex	St, i	40—60	3.—	—	—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Jasminum, echter Jasmin					
Beesianum	St	30—50	0.80	—	—
nudiflorum . . . . . mit Ballen	St	30—50	1.30	11.50	—
officinale . . . . . mit Ballen	St	30—50	1.30	—	—
Juglans, Walnuß					
nigra, schwarze Walnuß		125—175	1.35	12.50	120.—
		200—250	1.60	15.50	145.—
regia, Walnuß, siehe „Obstbäume"					
Kalmia latifolia, Lorbeerrose, Kalmie, mit Ballen	St,R,i	30—40	3.50	32.—	—
„ „		40—60	4.40	40.—	—
„ „		60—80	5.85	53.—	—
Kerria, Ranunkelstrauch					
japonica	H, S	60—80	0.65	6.—	53.—
japonica argenteo-variegata	St	30—40	0.80	7.30	—
japonica flore-pleno	H, S	60—80	0.80	7.30	67.—
Laburnum, Goldregen					
Adamii		100—150	1.35	—	—
alpinum	R, S	100—150	0.80	7.30	—
vulgare, gemeiner Goldregen	R, S	100—150	0.65	6.—	53.—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	2.35	22.—	—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.80	36.—	—
vulgare Alschingeri	R, S	60—80	1.35	—	—
Watereri (L. Vossii)	R, S	70—100	1.35	12.50	120.—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	2.55	24.—	—
Hochstämme, Stammhöhe		ca. 200	4.—	38.—	—
Lavandula officinalis (L. vera), Lavendel . . .	H,St,i	—	0.40	3.20	27.—
Leucothoe Catesbaei (Andromeda Catesbaei), Traubenheide . . . . . mit Ballen	St, i	40—60	2.55	23.—	—
		60—80	3.30	30.—	—
Ligustrum, Liguster, Rainweide					
iodense	H,R,i	30—40	0.50	4.50	40.—
		40—60	0.60	5.20	47.—
ovalifolium	H, R, S, i				
3jährig verpflanzt, mit 5—8 Trieben					
1000 St. RM. 95.—		30—50	0.20	1.50	10.50
1000 St. RM. 115.—		50—80	0.25	1.80	12.—
1000 St. RM. 150.—		80—100	0.25	2.—	16.—
2 × verpfl. Büsche aus weitem Stand					
mit 5—8 Trieben 1000 St. RM. 160.—		40—60	0.25	2.—	17.50
„ 5—8 „ 1000 St. RM. 180.—		60—80	0.35	2.70	20.—
„ 5—8 „ 1000 St. RM. 240.—		80—100	0.40	3.20	26.50
„ 8—12 „ 1000 St. RM. 265.—		60—80	0.40	3.30	29.50
„ 8—12 „ 1000 St. RM. 320.—		80—100	0.45	4.—	35.—
(Jüngere 2jährige Pflanzen, siehe „Junggehölze")					
ovalifol. aureo-elegantissimum	R, i	30—50	0.80	—	—
vulgare	H,R,S				
3jährig verpflanzt, mit 5—8 Trieben					
1000 St. RM. 90.—		30—50	0.20	1.50	10.50
1000 St. RM. 135.—		50—80	0.25	2.—	16.—
1000 St. RM. 175.—		80—100	0.35	2.70	20.—
2 × verpflanzte Büsche aus weitem Stand					
mit 5—8 Trieben 1000 St. RM. 160.—		40—60	0.25	2.—	17.50
„ 5—8 „ 1000 St. RM. 180.—		60—80	0.35	2.70	20.—
„ 5—8 „ 1000 St. RM. 240.—		80—100	0.40	3.20	26.50
„ 8—12 „ 1000 St. RM. 265.—		60—80	0.40	3.30	29.50
„ 8—12 „ 1000 St. RM. 320.—		80—100	0.45	4.—	35.—
„ 12—20 „		60—80	0.45	4.—	35.—
„ 12—20 „		80—100	0.50	4.50	40.—
(Jüngere 2jährige Pflanzen, siehe „Junggehölze")					

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ligustrum (Fortsetzung)					
vulgare atrovirens	H,R, S,i				
3jährig verpflanzt, mit 5—8 Trieben					
1000 St. RM. 170.—		30—50	0.30	2.40	19.—
1000 St. RM. 200.—		50—80	0.35	2.70	22.—
1000 St. RM. 240.—		80—100	0.40	3.20	26.50
2 × verpflanzte Büsche aus weitem Stand					
mit 5—8 Trieben 1000 St. RM. 240.—		40—60	0.40	3.20	26.50
„ 5—8 „ 1000 St. RM. 280.—		60—80	0.45	4.—	31.—
„ 5—8 „ 1000 St. RM. 350.—		80—100	0.50	4.50	37.50
„ 8—12 „ 1000 St. RM. 265.—		40—60	0.40	3.30	29.50
„ 8—12 „ 1000 St. RM. 335.—		60—80	0.45	4.—	36.50
„ 8—12 „ 1000 St. RM. 400.—		80—100	0.55	5.—	44.—
„ 12—20 „		60—80	0.55	5.—	44.—
„ 12—20 „		80—100	0.60	5.30	48.—
(Jüngere 2jährige Pflanzen, siehe „Junggehölze")					
Liquidambar styraciflua, Amberbaum		100—150	1.35	12.50	—
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum,	R,B				
Pyramiden, mit Ballen		125—150	2.—	18.—	160.—
„ „ „		150—200	2.90	26.50	—
„ „ „		200—250	4.—	36.—	—
Hochstämme, mit Ballen, Stammumfang		8—10	5.30	—	—
„ „ „ „		10—12	6.50	—	—
Lonicera, Heckenkirsche					
Schlingende Sorten, siehe unter „Schlingpflanzen"					
alpigena	H,R,B	30—50	0.50	4.50	40.—
amoena alba	H,R,B	125—175	0.50	4.50	40.—
chrysantha	R,S	100—150	0.50	4.50	40.—
coerulea	H,R,B	60—100	0.50	4.50	40.—
japonica aureo-reticulata	St	—	1.30	12.—	—
Ledebourii	H,R,B	100—150	0.60	5.20	47.—
Morrowii	H,R,B	125—175	0.50	4.50	40.—
pileata mit Ballen, Breite	H,St,	30—40	0.65	5.50	47.—
„ „ „	R,i	40—60	0.80	7.—	60.—
Ruprechtiana	H,R,B	125—175	0.50	4.50	40.—
spinosa Albertii	H,St, R,B	50—70	0.65	6.—	53.—
tatarica	H,R, S,B	100—150	0.50	4.50	40.—
tatarica pulcherrima	H,R, S,B	100—150	0.50	4.50	40.—
tatarica rosea	H,R, S,B	100—150	0.50	4.50	40.—
xylosteum	H,R, S,B	100—150	0.50	4.50	40.—
yunnanensis mit Ballen	H,St,	40—60	1.—	9.—	80.—
„ „	R,i	60—80	1.15	10.50	93.—
Lycium halimifolium (L. vulgare), Bocksdorn	H,R,B	80—120	0.50	4.50	40.—
Magnolia, Magnolie, Biberbaum					
kobus	R	150—200	4.70	42.50	—
		200—250	5.85	53.—	—
		250—300	6.50	60.—	—
amabilis, **soulangeana**, **souangeana alba**, **soulangeana Alexandrina**, **soulangeana nigra**		80—100	8.50	80.—	—
		100—125	9.50	90.—	—
		125—150	12.50	120.—	—
stellata		60—80	7.—	65.—	—
		80—100	9.20	87.—	—
		100—125	12.—	110.—	—
		125—150	16.—	150.—	—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Mahonia aquifolium, Mahonie					
Verpflanzte Büsche aus weitem Stand, ohne Ballen	H,St,	20—30	0.40	3.30	29.50
„ „	R,S,	30—40	0.45	4.15	37.50
„ „	i,B	40—50	0.55	5.—	44.—
mit Ballen		30—40	0.80	7.—	60.—
„ „		40—50	0.85	7.50	67.—
„ „		50—60	1.—	9.—	80.—
Verpfl. Büsche aus halbweitem Stand, ohne Ballen		25—40	0.35	2.70	20.—
(Jüngere 3—4jährige Pflanzen, siehe „Junggehölze")					
Malus, Zierapfel, Kirschapfel					
In Sorten meiner Wahl		125—175	1.20	11.50	105.—
Vorrätige Sorten:					
baccata fructu flavo	B	80—100	1.20	11.50	—
baccato fructu maximo	B	80—100	1.20	11.50	—
baccata The Fairy	B	80—100	1.20	11.50	—
floribunda Arnoldiana	B	80—100	1.20	11.50	—
floribunda purpurea	B	100—150	1.20	11.50	105.—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	1.80	16.50	—
Hochstämme, Stammumfang		7—9	2.95	28.—	—
John Downing	B	80—125	1.20	11.50	105.—
micromalus	B	80—125	1.20	11.50	105.—
Ökonomierat Echtermeyer	B	80—125	1.30	12.—	—
pumila Niedzwetzkyana	B	80—125	1.20	11.50	105.—
pumila pendula „Elise Rathke"	Tr,B	100—150	1.30	12.—	—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	2.40	22.50	215.—
Hochstämme, Stammumfang		7—9	3.65	35.—	—
purpurea Eleyi	B	100—150	1.20	11.50	105.—
ringo	B	80—100	1.20	11.50	—
Sargentii	St,B	80—100	1.30	12.—	—
Scheideckeri	B				
Büsche mit 3—5 Trieben		80—100	0.80	7.30	67.—
„ „ 5—8 „		100—150	1.20	11.50	105.—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	1.80	17.—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—9	2.95	28.—	—
Sieboldii calocarpa	B	80—100	1.20	11.50	—
Morus alba, weißfrüchtige Maulbeere	H	60—100	0.45	4.—	33.—
		100—150	0.50	4.50	40.—
nigra	H	60—100	0.50	4.50	40.—
Myrica cerifera, Gagelstrauch, Wachsmyrte	R,i	50—70	0.70	6.50	60.—
		70—100	0.90	8.50	80.—
Pachysandra terminalis, Dickanthere	St,S,i	—	0.40	3.20	27.—
Paeonia moutan (P. arborea), Strauchpäonie, Hybriden in verschiedenen guten Sorten	St	—	4.—	36.—	—
Parthenocissus (Ampelopsis), siehe „Schlingpflanzen"					
Periploca graeca, Baumschlinge, siehe „Schlingpflanzen"					
Pernettya, Torfmyrte					
mucronata mit Ballen	St,S,i	20—30	2.—	18.—	160.—
mucronata major mit Ballen	St,S,i	20—30	2.—	18.—	160.—
mucronata purpurea mit Ballen	St,S,i	20—30	2.—	18.—	160.—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Philadelphus, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin					
I. Hochwachsende Sorten:					
Billiardii	H,R,S	125—175	0.50	4.50	—
brachybotrys	H,R,S	125—175	0.50	4.50	40.—
coronarius	H,R,S	125—175	0.50	4.50	40.—
Falconeri	R,S	125—175	0.50	4.50	40.—
latifolius	H,R,S	125—175	0.50	4.50	40.—
pubescens	H,R,S	125—175	0.50	4.50	40.—
sanguineus	H,R,S	125—175	0.50	4.50	40.—
satsumi yokohamae	H,R,S	125—175	0.50	4.50	40.—
Wilsonii	R,S	60—80	0.50	4.50	—
II. Mittelhochwachsende Sorten:					
Lemoinei Belle Etoile	H,R,S	60—80	0.50	4.50	40.—
Lem. Virginal	H,R,S	80—120	0.60	5.20	47.—
III. Niedrigbleibende Sorten:					
coronarius aureus	H,St	40—60	0.50	4.50	40.—
Lem. Avalanche	H,R,S	80—100	0.50	4.50	40.—
Lem. Bouquet blanc	H,R,S	60—80	0.50	4.50	40.—
Lem. Dame blanche	H,R,S	40—60	0.50	4.50	40.—
Lem. erectus	H,R,S	70—100	0.50	4.50	40.—
Lem. Girandole	H,R,S	80—120	0.65	6.—	53.—
Lem. Manteau d'hermine	H,St, R,S	60—80	0.50	4.50	40.—
Lem. Montblanc	H,R,S	70—100	0.50	4.50	40.—
Physocarpus, Blasenspiere					
capitatus (Spiraea capitata)	S	125—175	0.50	4.50	40.—
opulifolius (Spiraea opulifolia)	H,S	125—175	0.50	4.50	40.—
opulifolius luteus	H	125—175	0.50	4.50	40.—
Pirus salicifolia pendula, Trauerbirne, Halbstämme, Stammhöhe	R,Tr	ca. 150	2.—	—	—
Platanus, Platane					
acerifolia Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang	H,R	12—14	4.80	45.50	—
acerifolia pyramidalis	H,R	100—150	0.80	7.30	67.—
Polygonum, Knöterich, siehe „Schlingpflanzen"					
Populus, Pappel					
alba nivea	R	150—200	0.70	6.50	60.—
		200—250	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.45	23.—	220.—
" "		10—12	3.10	29.50	280.—
alba pyramidalis (P. alba Bolleana)	R	150—200	1.35	12.50	120.—
		200—250	2.20	21.—	200.—
		250—300	3.65	35.—	335.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	4.20	40.—	380.—
" "		10—12	5.10	48.—	—
angulata cordata robusta	R	150—200	0.70	6.50	60.—
		200—300	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	1.60	15.50	145.—
" "		10—12	2.20	21.—	200.—
" "		12—14	2.95	28.—	—
balsamifera	R	150—200	0.70	6.50	60.—
		200—300	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	1.60	15.50	145.—
" "		10—12	2.20	21.—	200.—
berolinensis	R	200—250	1.15	10.50	100.—
		250—300	1.80	17.50	160.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.20	21.—	200.—
" "		10—12	2.95	28.—	265.—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Populus (Fortsetzung)					
canadensis	R	150—200	0.70	6.50	60.—
		200—300	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	1.60	15.50	145.—
" "		10—12	2.20	21.—	200.—
" "		ca. 40	16.—	—	—
lasiocarpa	R	100—150	1.35	12.50	120.—
		150—200	1.80	17.—	160.—
		200—250	2.65	25.50	240.—
nigra	R	150—200	0.70	6.50	60.—
		200—300	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	1.60	15.50	145.—
" "		10—12	2.20	21.—	200.—
nigra pyramidalis (P. nigra fastigiata oder P. nigra italica), bis unten voll garnierte Pflanzen aus weitem Stand (weniger gut garnierte 33⅓ % billiger)	H, R	150—200	0.80	7.30	67.—
		200—250	1.10	10.50	100.—
		250—300	1.80	17.—	160.—
		300—350	2.95	28.—	265.—
		350—400	4.40	42.—	400.—
		400—500	5.90	56.—	535.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.65	25.50	240.—
" "		10—12	3.25	31.—	295.—
Simonii	R	150—200	0.70	6.50	60.—
		200—300	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.20	21.—	200.—
" "		10—12	2.95	28.—	265.—
Simonii fastigiata	R	150—200	0.90	8.50	80.—
		200—250	1.35	12.50	120.—
		250—300	2.10	20.—	185.—
tremula	R	100—150	0.70	6.50	60.—
		150—200	0.90	8.50	80.—
		200—250	1.35	12.50	120.—
trichocarpa	R	150—200	0.70	6.50	60.—
		200—300	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	1.60	15.50	145.—
" "		10—12	2.20	21.—	200.—
Wilsonii	-	200—300	2.—	19.—	180.—
Potentilla, Fingerstrauch					
Farreri	H, St	50—70	0.65	6.—	53.—
Friedrichsenii	H, St	60—80	0.50	4.50	40.—
fruticosa	H, St	60—80	0.50	4.50	40.—
fruticosa mandschurica mit Ballen, Breite	St	30—40	1.—	9.—	—
fruticosa Purdomii	H, St	60—80	0.60	5.20	47.—
fruticosa Veitchii	H, St	40—60	0.60	5.20	47.—
Prunus, Kirsche, Pflaume					
avium plena	B	80—100	1.20	11.50	—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	1.80	17.—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—10	3.30	31.50	—
blireana	H	80—120	1.—	9.50	—
cerasifera (P. myrobalana)	H,R,B	100—150	0.50	4.50	40.—
cerasifera Pissardiii	H, B	100—150	0.80	7.30	67.—
cerasifera Pissardii nigra	H, B	100—150	0.80	7.30	67.—
cerasifera Pissardii Spaethiana	H, B	100—150	0.80	7.30	67.—
cerasus Rhexii	R	50—70	1.15	10.50	—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	1.80	17.—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—10	3.30	31.50	—
fruticosa Hochstämme, Stammumfang	R	7—10	3.30	—	—
glandulosa albo-plena (P. japonica alba plena)	St	60—80	1.15	10.50	—
japonica rosea plena (P. glandulosa sinensis)	St	60—80	0.90	8.50	—
laurocerasus Fiesseriana	S, i	30—40	1.65	15.—	135.—
lauroc. schipkaensis macrophylla	H, St,	40—60	2.40	22.—	200.—
	R,S, i	60—80	3.65	33.50	305.—
lauroc. schipk. Reynvanii	H, St,	30—40	1.45	13.—	120.—
	R,S, i	40—60	1.65	15.—	135.—
lauroc. Zabeliana Breite	H, St,	40—60	2.40	21.50	—
"	R,S, i	60—80	2.90	26.50	—
mahaleb	H,R,B	80—125	0.45	4.—	33.—
myrobalana, siehe P. cerasifera					
nana	St,R,B	40—60	1.20	11.50	—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Prunus (Fortsetzung)					
padus	H,S,B	100—150	0.60	5.20	47.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.20	21.—	—
persica Klara Mayer	R,B	80—120	3.20	29.—	—
Pissardii und Pissardii nigra, siehe P. cerasifera Pissardii					
serotina	H,S,B	100—150	0.50	4.50	40.—
serrulata Hisakura	B	80—120	1.20	11.50	105.—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	1.80	16.50	—
Halbstämme, extra stark, Stammumfang		12—16	2.95	28.—	265.—
Hochstämme, Stammumfang		7—10	3.30	—	—
serrulata Mount Fuji	B	80—120	1.20	—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—10	3.30	—	—
serrulata Shidare Sakura	Tr,B	80—120	1.50	14.—	—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	2.80	—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—10	3.80	—	—
serrulata Ukon	B	80—120	1.20	—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—10	3.30	—	—
serrulata Yoshino	B	80—120	1.20	—	—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	1.80	—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—10	3.30	—	—
spinosa	H,R,B	60—80	0.45	4.—	33.—
		80—120	0.60	5.20	47.—
spinosa purpurea	H,B	80—120	0.80	7.30	67.—
subhirtella plena		80—120	1.20	—	—
triloba flore—pleno Büsche mit 3—5 Trieben		—	0.45	4.—	33.—
„ „ 5—8 „		—	0.65	6.—	53.—
Halbstämme, Stammhöhe		40—60	0.90	8.50	—
„ „		60—80	1.15	10.50	—
„ „		80—100	1.80	17.—	—
„ „		100—120	2.20	21.—	—
„ „		120—140	2.95	28.—	—
Mittelstämme, „		140—160	3.65	—	—
Hochstämme, „		160—180	4.40	—	—
virginiana	S,B	100—150	0.60	5.20	47.—
Ptelea trifoliata, Lederbaum	R	60—100	0.50	4.50	—
Pyracantha (Crataegus pyracantha), Feuerdorn					
coccinea mit Ballen	H,St,i	20—30	1.—	9.—	80.—
„ „		30—40	1.30	11.50	105.—
„ „		40—60	1.65	15.—	135.—
„ „		60—80	2.—	18.—	160.—
coccinea Kasan mit Ballen	H,St,i	30—40	1.65	15.—	135.—
„ „		40—60	2.—	18.—	160.—
coccinea Lalandii mit Ballen	H,St,i	30—40	1.35	12.—	—
coccinea pauciflora mit Ballen	H,St,i	40—60	1.65	15.—	135.—
„ „		60—80	2.—	18.—	160.—
Quercus, Eiche					
coccinea, Scharlacheiche, aus Veredlungen gezogene	R	8—10	6.50	60.—	—
Hochstämme, Stammumfang		10—12	8.—	75.—	—
palustris, Sumpfeiche	R,S	100—150	0.80	7.30	67.—
		150—200	1.10	10.50	100.—
		200—300	1.35	12.50	120.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	4.40	42.—	—
„ „		10—12	5.55	53.—	—
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		12—14	8.80	84.—	—
„ „ „		14—16	10.—	95.—	—
„ „ „		16—18	11.—	105.—	—
pedunculata (Qu. robur), deutsche Eiche, Stieleiche	H,R,B	80—100	0.60	5.20	47.—
		100—125	0.65	6.—	53.—
		125—150	0.90	8.50	80.—
		150—200	1.20	11.50	105.—
		200—250	1.80	17.—	160.—
		250—300	2.65	25.50	240.—
		300—400	4.—	36.—	—
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		8—10	5.30	50.—	—
„ „ „		20—25	4.70	—	—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Quercus (Fortsetzung)					
ped. Concordia, Goldeiche . . . . mit Ballen		100—125	7.—	65.—	—
" "		125—150	8.50	80.—	—
" "		200—250	12.—	—	—
ped. fastigiata, Pyrameideneiche . . . mit Ballen	H	150—175	4.—	36.50	—
" "		175—200	4.80	44.—	—
" "		200—250	6.40	58.50	—
" "		250—300	9.—	85.—	—
" "		300—350	10.50	—	—
" "		350—400	16.—	—	—
" "		450—500	40.—	—	—
rubra, amerikanische Eiche, Roteiche	R	100—150	0.65	6.—	53.—
		150—200	0.70	6.50	60.—
		200—300	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.—	27.50	250.—
" "		10—12	4.—	36.—	325.—
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		12—14	5.90	56.—	535.—
" " "		14—16	7.50	72.50	700.—
sessilis (Qu. sessiliflora), Traubeneiche	R	150—200	2.20	21.—	200.—
		200—250	2.95	28.—	265.—
Rhamnus, Faulbaum, Wegdorn					
cathartica, gemeiner Wegdorn	H,R, S,B	80—120	0.50	4.50	40.—
frangula, gemeiner Faulbaum	H,R, S,B	100—150	0.50	4.50	40.—
Rhododendron, Alpenrose					
catawbiense grandiflorum, Freilandpflanzen, mit Knospen gut besetzt, gedrungen, von unten verzweigt	R,S,i	30—40	2.65	24.—	220.—
		40—50	3.20	29.—	265.—
		50—60	3.75	34.—	295.—
		60—70	4.40	40.—	360.—
		70—80	6.—	55.—	505.—
		80—90	8.50	80.—	—
arboreum- und catawbiense-Hybriden, Veredlungen, in vielen guten, winterharten Sorten und allen Farben, Freilandpflanzen, mit Knospen gut besetzt, gedrungen, von unten verzweigt	R,S,i	30—40	2.65	24.—	220.—
		40—50	3.20	29.—	265.—
		50—60	3.75	34.—	295.—
		60—70	4.40	40.—	360.—
		70—80	6.—	55.—	505.—
		80—90	8.50	80.—	—
		90—100	9.70	92.—	—
Cunninghamii white, Freilandpflanzen, mit Knospen gut besetzt, gedrungen, von unten verzweigt .	R,S,i	30—40	2.65	24.—	220.—
		40—50	3.20	29.—	265.—
		50—60	3.75	34.—	295.—
Rhododendron der vorstehenden Sorten mit wenig Knospen oder kleinen Fehlern, für Unterpflanzung hervorragend geeignet, sind 20 % billiger					
Treib-Rhododendron . . . mit 8—12 Knospen			—	2.90	26.50	240.—
" 12—15 "			—	3.55	32.50	295.—
" 15—20 "			—	4.—	36.50	335.—
ferrugineum	St,R,i	20—30	2.90	26.50	—
		30—40	4.—	36.—	—
hirsutum	St,R,i	20—30	2.90	26.50	—
		30—40	4.—	36.—	—
laetevirens (Rh. Wilsonii)	St,R, S,i	40—50	4.80	44.—	—
		50—60	5.30	48.—	—
minus (Rh. punctatum)	St,R, S,i	30—40	2.90	26.50	—
		40—50	3.60	33.—	—
praecox	St,R, S,i	30—40	2.90	26.50	—
		40—50	4.—	36.—	—
		50—60	5.30	48.—	—
Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrie . . .	S	70—100	0.50	4.50	40.—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Rhus, Sumach, Essigbaum					
cotinus, siehe Cotinus coggygria					
glabra		100—125	1.15	10.50	—
typhina	R	100—150	0.90	8.50	80.—
		150—200	1.15	10.50	100.—
Hochstämme, Stammumfang		10—12	4.20	—	—
" "		12—14	5.30	—	—
" "		14—18	6.50	—	—
" "		18—22	8.—	—	—
Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere					
alpinum Weber, Neueinführung 1938. Es ist dies eine ausgelesene Form, die sich besonders dadurch auszeichnet, daß die Pflanze das Laub sehr lange hält, in normalen Jahren bis in den Dezember hinein. Ferner wird dieselbe nicht von der Blattfallkrankheit befallen. Der Wuchs ist breitbuschig. . .	H,R,S				
3jährige kleine Büsche mit 3—5 Trieben		30—40	0.35	2.90	24.—
" " " " 3—5 "		40—60	0.40	3.20	27.—
" " " " 3—5 "		60—80	0.45	3.70	32.—
Verpflanzte Büsche aus weitem Stand					
mit 5—8 Trieben		40—60	0.50	4.50	40.—
" 5—8 "		60—80	0.60	5.20	47.—
" 5—8 "		80—100	0.65	6.—	53.—
" 8—12 "		40—60	0.70	6.50	60.—
" 8—12 "		60—80	0.80	7.30	67.—
" 8—12 "		80—100	0.85	8.—	73.—
aureum	H,R,S	100—120	0.50	4.50	40.—
divaricatum (R. arboreum)	H,R,S	100—125	0.50	4.50	40.—
floridum	H,R,S	100—125	0.50	4.50	40.—
Gordonianum	H,R,S	100—125	0.60	5.20	—
sanguineum	H,R,S	100—120	0.60	5.20	47.—
sanguineum atrorubens	H,R,S	100—120	0.60	5.20	47.—
sanguineum carneum	H,R,S	100—120	0.60	5.20	47.—
Robinia, Akazie					
hispida, rotblühende Akazie	B	70—100	1.20	11.50	—
Halbstämme, Stammhöhe		ca. 125	4.—	—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—10	5.30	—	—
neo-mexicana	B	150—200	1.20	11.50	105.—
pseudacacia, gemeine Akazie	H,R,B	100—150	0.60	5.20	47.—
		150—200	0.70	6.50	60.—
Hochstämme, Stammumfang		7—10	2.40	—	—
pseudacacia Bessoniana, starkwüchsige Kugelakazie	R	8—10	4.40	40.—	—
Hochstämme, Stammumfang		10—12	5.85	53.—	—
pseudacacia Decaisneana	B	100—150	1.20	11.50	—
pseudacacia umbraculifera (R. inermis), echte Kugelakazie . . . . Hochstämme, Stammumfang	R	8—10	4.40	40.—	—
" "		10—12	5.85	53.—	—
" "		44—48	27.—	—	—
Rosa, Rose					
Veredelte Parkrosen, Moosrosen und andere Gartenrosen, siehe „Rosen"					
canina, bekannte, wilde Heckenrose	H,B	80—100	0.45	4.—	33.—
humilis lucida	B	80—100	0.40	3.20	27.—
		100—150	0.45	4.—	33.—
multiflora	B	60—100	0.45	4.—	33.—
rubiginosa	H,B	80—125	0.45	4.—	33.—
rubrifolia	H,S,B	80—125	0.50	4.50	40.—
rugosa (R. rugosa Regeliana)	H,S,B	30—40	0.45	4.—	33.—
		40—60	0.50	4.50	40.—
		100—120	0.60	5.20	47.—
rugosa hollandica	H,R,S	80—120	0.45	4.—	33.—
Rubus, Brombeere, Himbeere					
laciniatus	R,B	80—120	0.50	4.50	40.—
odoratus	R,S	125—175	0.50	4.50	40.—
phoenicolasius, japanische Weinbeere	R	100—150	0.50	4.50	40.—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Salix, Weide					
alba	R	175—250	0.50	4.50	40.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.20	21.—	—
" "		10—12	2.40	22.50	—
alba splendens (S. alba argentea)	R	100—150	0.50	4.50	40.—
		200—300	0.60	5.20	47.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.20	21.—	—
" "		10—12	2.40	22.50	—
alba vitellina britzensis	R	150—200	0.60	5.20	47.—
alba vitellina pendula, Heister, von unten garniert,	R,Tr	150—200	1.20	11.50	105.—
mit geradem Mitteltrieb		200—250	1.50	14.—	135.—
		250—300	2.20	21.—	200.—
		300—350	2.95	28.—	265.—
Hochstämme, Stammumfang		7—8	2.40	22.50	215.—
" "		8—10	3.25	31.—	295.—
" "		10—12	4.40	42.—	400.—
" "		12—14	5.85	53.—	—
caprea	R,S,B	100—150	0.70	6.50	60.—
caprea latifolia	R,S,B	100—150	0.70	6.50	60.—
caprea mas	R,S,B	125—175	0.90	8.50	80.—
caprea pendula	R,S,				
Halbstämme, Stammhöhe	Tr	ca. 125	3.30	—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—9	4.60	—	—
" "		14—16	7.—	—	—
cinerea	R,B	150—200	0.50	4.50	40.—
daphnoides (S. latifolia glabra)	R,B	200—300	0.60	5.20	47.—
daphnoides praecox	R,B	200—300	0.60	5.20	47.—
daphnoides ruberrima	R,B	200—300	0.60	5.20	47.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.20	21.—	—
" "		10—12	2.40	22.50	—
incana (S. rosmarinifolia)	R,B	80—100	0.60	5.20	47.—
pentandra (S. laurifolia)	H,R	150—200	0.60	5.20	47.—
purpurea nana	St,R	60—80	0.60	5.20	47.—
purpurea pendula (S. atrovirens pendula)	R,Tr	40—60	0.65	6.—	—
Hochstämme, Stammumfang		7—9	4.20	40.—	380.—
rotundifolia	R.B	80—120	0.60	5.20	47.—
Smithiana	R,B	150—250	0.60	5.20	47.—
utilense	R,B	200—300	0.60	5.20	47.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.20	21.—	—
" "		10—12	2.40	22.50	—
viminalis	R,B	200—300	0.50	4.50	40.—
Sambucus, Holunder					
canadensis	S	100—150	0.50	4.50	40.—
nigra	H,S	80—125	0.45	4.—	33.—
		125—175	0.50	4.50	40.—
nigra argenteo-marginata	S	80—125	0.50	4.50	—
nigra laciniata	S	100—150	0.50	4.50	—
nigra lutea	S	100—150	0.50	4.50	—
racemosa	H,R,S	80—125	0.45	4.—	33.—
		125—200	0.50	4.50	40.—
Skimmia japonica, Skimmie mit Ballen	St,i	25—30	3.30	—	—
Sophora japonica, Schnurbaum	B	150—200	1.—	9.50	—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	4.60	—	—
Sorbus, Eberesche					
aria chrysophylla Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.45	23.—	—
" "		10—12	3.10	29.50	—
aria lutescens, Mehlbeere, Hochstämme, Stammumfang	R,B	8—10	2.45	23.—	—
" "		10—12	3.10	29.50	—
" "		12—14	4.—	38.—	—
aucuparia, bekannte Eberesche	R,S,B	150—200	0.90	8.50	80.—
		200—300	1.20	11.50	105.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	1.80	17.—	—
aucuparia moravica, süßfrüchtige, eßbare Eberesche	R,B				
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.45	23.50	—
" "		10—12	3.10	29.50	—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Sorbus (Fortsetzung)					
aucuparia pendula, Trauereberesche,	R,Tr				
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.65	25.50	—
" "		10—12	3.30	31.50	—
aucuparia pendula variegata,	Tr				
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.45	23.—	—
suecica (S. scandica), nordische Eberesche	R,B	150—200	0.90	8.50	80.—
		200—300	1.20	11.50	105.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	1.80	17.—	160.—
" "		10—12	2.40	22.—	—
" "		12—14	3.—	27.50	—
" "		14—16	3.65	35.—	—
Spiraea, Spierstrauch					
albiflora (Sp. callosa alba)	H,St,B	30—40	0.45	4.—	33.—
		40—60	0.50	4.50	40.—
arcuata	H,B	80—120	0.60	5.20	47.—
arguta	H,St,B	60—100	0.70	6.50	60.—
ariaefolia, siehe Holodiscus discolor					
Billiardii	R,B	100—125	0.50	4.50	40.—
capitata, siehe Physocarpus capitatus					
Douglasii	H,B	80—100	0.50	4.50	40.—
hypericifolia truncata (Sp. thalictroides)	S,St,B	50—70	0.50	4.50	40.—
japonica Fortunei semperflorens	B	100—150	0.50	4.50	40.—
Nobleana	B	80—100	0.50	4.50	40.—
opulifolia und opulifolia lutea, siehe Physocarpus opulifolius					
prunifolia plena	St,B	60—80	0.70	—	—
pumila Anthony Waterer (Sp. Bumalda Anthony Waterer)	H,St, R,B	30—40	0.45	4.—	33.—
		40—60	0.50	4.50	40.—
pumila Froebelii (Sp. callosa Froebelii)	H,St, R,B	50—70	0.50	4.50	40.—
Thunbergii	H,R, B,St	40—60	0.70	6.50	60.—
tomentosa	H,B	60—80	0.50	4.50	40.—
Vanhouttei	H,R,B	80—120	0.50	4.50	40.—
Veitchii	H,B	40—70	0.70	6.50	—
Staphylea, Pimpernuß					
colchica	B	70—100	0.90	8.50	—
pinnata	S,B	60—80	0.50	4.50	—
Stephanandra, Kranzspiere					
incisa (St. flexuosa)	St	50—70	0.50	4.50	—
tanakae	St,B	70—100	0.50	4.50	—
Stranvaesia Davidiana, Stranvaesie mit Ballen	St,i,B	50—70	1.35	12.—	—
Symphoricarpus, Schneebeere					
Chenaultii	H,R, S,B	60—80	0.45	4.—	33.—
		80—100	0.50	4.50	40.—
Giraldii	H,R, S,B	60—80	0.50	4.50	40.—
orbiculatus	H,R, S,B	60—80	0.50	4.50	40.—
		40—60	0.50	4.50	40.—
orbiculatus aur.-var.	H,R,	60—80	0.45	4.—	33.—
racemosus	S,B	80—100	0.50	4.50	40.—
Syringa, Syringe					
amurensis japonica (S. japonica)	B	60—100	0.90	8.50	80.—
chinensis (S. rothomagensis)	H,R,B	80—120	1.35	12.50	120.—
Halbstämme, Stammhöhe		80—100	1.95	—	—
" "		100—120	2.40	—	—
chinensis rubra	H,R,B	80—100	1.35	12.50	120.—
Josikaea	H,B	100—150	0.90	—	—
reflexa	B	70—100	0.80	7.30	67.—
		100—150	0.90	8.50	80.—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Syringa (Fortsetzung)					
Sweginzowii	B	70—100	0.90	—	—
tomentella	H,B	60—100	0.80	7.30	67.—
vulgaris	H,B	80—100	0.60	5.20	47.—
		100—125	0.70	6.50	60.—
vulgaris alba	H,B	80—100	0.65	6.—	53.—
vulgaris Marlyensis	H,B	100—125	0.60	5.20	47.—
vulgaris, in veredelten Sorten,	H,B				
Sträucher mit 3—5 Trieben		50—80	0.70	6.50	60.—
" " 5—8 "		65—100	1.15	10.50	100.—
" " 8—12 "		80—120	1.80	17.—	—
Extra starke Sträucher mit 5—8 Trieben		80—120	1.80	17.—	—
" " " " 8—12 "		80—120	2.40	22.50	—
" " " " 12—20 "		100—150	2.95	28.—	—
Extra starke Sträucher, mit Ballen		120—150	4.80	44.—	400.—
" " " " "		150—200	6.40	58.50	535.—
Halbstämme, Stammhöhe		80—100	1.95	18.—	—
" "		100—120	2.40	22.50	—
" "		120—140	2.95	28.—	—
Hochstämme, "		140—160	3.85	—	—
" "		160—180	5.15	—	—
" "		180—200	5.90	—	—
Vorrätige Syringen-Sorten:					
Andenken an Ludwig Späth, einfachblühend, großblumig, dunkelpurpur					
Catharine Havemeyer, gefüllt, dunkellilablau					
Charles Joly, gefüllt, dunkelrot					
Charles X., einfach lilarot, vorzüglich zum Treiben geeignet					
Congo, einfach, groß, dunkelrot					
Decaisne, einfach, groß, Knospe hellkarminfarbig, Blüten hellblau					
Fürst Bülow, einfach, purpurviolett					
Hugo Koster, Blüten einfach, große violette Rispen, Knospen rötlich					
Jan van Tol, weiß, einfach, außerordentlich großblumig					
Käthe Härlin, großblumig, einfach, reinweiß					
Mme. Antoine Buchner, gefüllt, zartrosa-lila					
Mme. Casimir Périer, starkgefüllt, rahmweiß					
Mme. Felix, einfach, weiß					
Mme. Florens Stepman, einfach, weiß, großblumig					
Mme. Lemoine, gefüllt, großblumig, blendendweiß					
Marie Legraye, einfach, großblumig, weiß, vorzüglich zum Treiben					
Michel Buchner, blaßlila, gefüllt, großblumig					
Perle von Teltow, einfach, dunkelviolett					
Président Carnot, gefüllt, hell-lilablau					
Président Grevy, rosalila, gefüllt, sehr großblumig					
Président Loubet, gefüllt, Knospen karmin, in purpurlila übergehend					
Professor Hugo de Vries, neuere Sorte, einfach, purpurrot					
Réaumur, purpurlila, einfach, großblumig					
Ruhm von Horstenstein, sehr großblumig, einfach, Farbe zwischen dunkellila und rot					
Sinai lila, einfachblühend					
Sinai rosa, einfachblühend					
Waldeck Rousseau, gefülltblühend, Blüten rosalila mit weißer Mitte, Knospe hellkarmin					
Tamarix, Tamariske					
africana		80—120	0.50	4.50	40.—
parviflora (T. tetrandra purpurea)		80—120	0.50	4.50	40.—
tetrandra		80—120	0.50	4.50	40.—
Teucrium chamaedrys, Gamander	H,St,i	10—15	0.25	2.—	16.—
		15—25	0.35	2.70	20.—
Tilia, Linde					
alba (T. argentea),	R,B				
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		24—28	18.—	175.—	—
" "		28—32	22.—	215.—	—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Tilia (Fortsetzung)					
americana megalodonta,					
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		16—18	9.50	90.—	—
" " "		18—20	11.—	107.—	—
" " "		20—24	14.—	135.—	—
" " "		24—28	18.—	175.—	—
euchlora, Krimlinde	H,R,B	200—300	1.80	17.—	160.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.—	27.50	250.—
" "		10—12	4.—	36.—	325.—
" "		12—14	4.80	44.—	—
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		14—16	8.—	76.—	735.—
" " "		16—18	10.30	98.—	—
" " "		20—24	14.—	135.—	—
" " "		36—40	33.—	—	—
" " "		40—44	47.—	—	—
grandifolia (T. platyphyllos), großblättrige Linde, Sommerlinde	B	125—150	0.45	4.—	33.—
		150—200	0.65	6.—	53.—
		200—300	1.15	10.50	100.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	2.50	22.50	200.—
" "		10—12	3.—	27.50	250.—
" "		12—14	3.60	33.—	—
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		14—16	6.50	62.50	—
" " "		16—18	8.—	76.—	—
" " "		18—20	9.50	—	—
" " "		20—24	11.—	105.—	—
" " "		24—28	13.50	130.—	—
" " "		32—36	24.—	—	—
		36—40	29.—	—	—
Handsworthii aurea . Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.—	27.50	—
" "		10—12	4.—	36.—	—
" "		12—14	4.80	44.—	400.—
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		14—16	8.—	76.—	—
" "		20—24	14.—	135.—	—
hybrida (T. intermedia, T. vulg.), holländische Linde	H,R,B	200—300	1.80	17.—	160.—
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.—	27.50	250.—
" "		10—12	4.—	36.—	325.—
" "		12—14	4.80	44.—	400.—
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		14—16	8.—	76.—	735.—
" " "		16—18	10.30	98.—	935.—
" " "		18—20	12.—	115.—	1100.—
pallida . . . . . Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.—	27.50	—
" "		10—12	4.—	36.—	—
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		14—16	8.—	76.—	—
" " "		16—18	10.30	98.—	—
" " "		18—20	12.—	115.—	1100.—
parvifolia, kleinblättrige oder Steinlinde,	H,S,				
Hochstämme, Stammumfang	R,B	8—10	3.—	27.50	250.—
" "		10—12	4.—	36.—	325.—
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		12—14	5.90	56.—	—
" " "		14—16	8.—	76.—	—
" " "		16—18	10.30	98.—	—
" " "		18—20	12.—	115.—	—
" " "		20—24	14.—	135.—	—
Ungeschnittene Büsche		125—175	0.80	7.30	67.—
		175—250	1.10	10.50	100.—
Mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, voll garnierte, geschnittene Heckenpflanzen		100—125	0.80	7.30	67.—
		125—150	0.90	8.50	80.—
		150—200	1.10	10.50	100.—
Breite Büsche		200—250	1.50	14.—	135.—
		300—400	4.—	38.—	360.—
tomentosa, echte, ungarische Silberlinde,	R				
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.—	27.50	250.—
" "		10—12	4.—	36.—	325.—
" "		12—14	4.80	44.—	—
Hochstämme, verpflanzt, Stammumfang		14—16	8.—	76.—	—
" " "		16—18	10.30	98.—	—
" " "		18—20	12.—	115.—	—
" " "		20—24	14.—	—	—

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ulex europaeus, Stechginster					
starke 1jährige Sämlinge mit Topfballen	St,R,i	20—30	0.45	4.—	33.—
Ulmus, Ulme, Rüster					
campestris, Feldulme oder -Rüster, gute Heckenpflanze, auch für Halbschatten, mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, vollgarniert	H,R, S,B	125—175	0.65	6.—	53.—
		175—250	0.90	8.50	80.—
		250—350	1.20	11.50	—
Hochstämme, Stammumfang		10—12	2.—	18.—	—
camp. Louis van Houtte		125—175	1.20	11.50	—
camp. Rueppelii, Kugelrüster,					
Hochstämme, Stammumfang		12—14	3.65	—	—
" "		20—24	8.—	—	—
foliacea Dampieri		80—120	0.85	8.—	—
		200—250	1.80	17.—	—
foliacea monumentalis		200—300	0.85	8.—	73.—
foliacea umbraculifera, Kugelrüster,					
Hochstämme, Stammumfang		12—14	3.65	—	—
foliacea Wredei, Goldpyramidenulme,					
Pyramiden mit Ballen		80—100	2.—	18.—	—
" " "		100—125	2.40	22.—	—
" " "		125—150	3.20	29.—	—
" " "		150—175	4.—	36.—	—
" " "		175—200	5.30	48.—	—
" " "		200—250	6.40	—	—
scabra fastigiata	H	200—250	2.20	21.—	—
		250—300	2.95	28.—	—
		350—400	4.40	40.—	—
scabra pendula, Trauerulme,	Tr				
Hochstämme, Stammumfang		8—10	3.55	33.50	—
" "		10—12	4.20	40.—	—
" "		12—14	5.10	48.—	—
Viburnum, Schneeball					
Carlesii mit Ballen	St	40—60	2.90	26.50	—
" "		60—80	3.60	33.—	—
dentatum		100—150	0.50	4.50	40.—
lantana	H,R,S	80—100	0.60	5.20	47.—
lentago	H,S	100—150	0.70	6.50	60.—
molle		100—125	0.50	4.50	40.—
		125—175	0.60	5.20	—
opulus	H,S	100—150	0.60	5.20	47.—
opulus sterile		80—125	0.65	6.—	53.—
Halbstämme, Stammhöhe		100—120	2.20	20.—	—
" "		120—140	2.65	24.—	—
rhytidophyllum mit Ballen	H,i	40—60	0.95	8.—	73.—
		60—80	1.—	9.—	—
tomentosum sterile mit Ballen		40—60	1.50	13.50	—
" "		60—80	1.65	15.—	—
Vinca, Immergrün					
major	St,i	—	0.40	3.20	—
minor	St,R, S,i	—	0.35	2.70	24.—
Weigela, siehe Diervilla					
Wistaria (Glycine), siehe „Schlingpflanzen"					

Stauden

Den Staudenvertrieb haben wir in diesem Jahre wegen durch den Krieg bedingtem Mangel an geeigneten Kräften einstellen müssen, da auch unser Staudenzüchter in seinen Arbeits- und Transportmöglichkeiten eingeschränkt ist. Wir hoffen, im nächsten Jahre wieder in der Lage zu sein, auch Stauden mitliefern zu können.

Schlingpflanzen

		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ampelopsis, siehe Parthenocissus				
Aristolochia macrophylla (A. sipho), Pfeifenstrauch, Osterluzei . . . . . starke Freilandpflanzen	S	1.80	17.—	160.—
Freilandpflanzen, Mittelqualität		1.35	12.50	—
Clematis, Waldrebe				
flammula	S	1.35	12.50	—
Jackmannii (dunkelviolett) **und andere großblumige Sorten** in verschiedenen Farben	S			
1jährige Veredlungen		1.35	12.50	120.—
2jährige Veredlungen		1.80	17.—	160.—
montana rubens	S	1.35	12.50	120.—
paniculata	S	1.35	12.50	—
tangutica	S	1.05	10.—	93.—
vitalba	R,S	0.80	7.30	67.—
viticella	R,S	1.35	12.50	—
Glycine, siehe Wistaria				
Hedera, Efeu				
helix, kleinblättrig . mit Ballen, mit 5—8 Ranken 60—80 cm	S,i,B	Auslandsware zur Lieferung Frühjahr 1941 — Preise auf Anfrage.		
helix hibernica, großblättrig, mit Ballen, mit 5—8 Ranken 60—80 cm	St,S, i,B	eigene Bestände erfroren,		
Hydrangea petiolaris, extra starke Pflanzen . . 60—80 cm		1.50	14.—	135.—
Lonicera, Geißblatt, „Jelängerjelieber"				
Hybriden in verschiedenen Sorten		1.15	10.50	—
caprifolium		0.90	8.50	80.—
Brownii fuchsioides		2.20	21.—	—
Brownii punicea		2.20	21.—	—
Heckrottii		2.20	21.—	—
Henryi	i	1.35	—	—
japonica aureo-reticulata	St	1.35	12.—	—
japonica repens	i	1.20	11.50	105.—
periclymenum		0.90	8.50	80.—
periclymenum florida		1.15	10.50	—
Tellmanniana		2.20	21.—	—
Parthenocissus (Ampelopsis), Jungfernwein				
Engelmannii . . . . . aufgebundene Pflanzen	R,B	0.50	4.50	40.—
quinquefolia . . aufgebundene Pflanzen mit 3—5 Ranken	R,B	0.35	2.70	20.—
" " " 5—8 "		0.45	4.—	33.—
radicantissima (P. muralis) . . . aufgebundene Pflanzen	R,B	0.50	4.50	40.—
Veitchii	R			
Veitchii gigantea				
Veitchii Gloire de Boskoop				
alle drei Sorten:				
1jährige Veredlungen mit Topfballen		0.60	5.20	47.—
2 " " " "		0.70	6.50	60.—
2jährige Freilandpflanzen, I. Qualität		0.60	5.20	47.—
2jährige Freilandpflanzen, Mittelqualität		0.45	4.—	35.—
Periploca graeca, Baumschlinge		1.15	10.50	—
Polygonum, Knöterich				
Aubertii . . . . . starke Freilandpflanzen	B	1.15	10.50	100.—
baldschuanicum . . . . . starke Freilandpflanzen	B	1.15	10.50	100.—

SCHLINGPFLANZEN

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Schlingrosen, siehe unter „Rosen"			
Wistaria (Glycine), Blauregen			
chinensis . . . . . starke Freilandpflanzen	1.80	17.—	160.—
Freilandpflanzen, Mittelqualität	1.50	14.—	—
chinensis flore-albo	2.55	23.50	—
chinensis flore-pleno	2.55	23.50	—
chinensis multijuga	2.55	23.50	—

Topffichten

Prima runde, gutgarnierte Pflanzen von tadelloser Farbe, frostfreie Ware

	10 St. RM.	100 St. RM.
30—40 cm hoch	3.—	27.—
40—60 „ „	3.60	33.—
60—80 „ „	4.40	40.—
80—100 „ „	5.20	47.—
100—125 „ „	6.50	60.—
125—150 „ „	9.—	80.—

Fichten mit Fehlern, zum Dichtpflanzen für Balkonkästen etc. vorzüglich geeignet, sind 50 % billiger!

Picea omorika, zum Eintopfen

30—40 cm hoch 10 St. RM. 5.20, 100 St. RM. 47.—

Picea orientalis, zum Eintopfen

ca. 20 cm hoch 10 St. RM. 3.30, 100 St. RM. 30.—

Picea pungens, zum Eintopfen

	10 St. RM.	100 St. RM.
20—30 cm hoch	3.30	30.—
30—40 „ „	4.—	36.—
40—60 „ „	4.80	44.—
60—80 „ „	6.—	53.—

Picea pungens glauca, zum Eintopfen

	10 St. RM.	100 St. RM.
20—30 cm hoch	8.—	73.—
30—40 „ „	10.—	90.—
40—60 „ „	16.—	145.—
60—80 „ „	20.—	180.—

Pinus montana, schöne, volle Pflanzen, zur Bepflanzung von Balkonkästen bestens geeignet

	10 St. RM.	100 St. RM.
20—30 cm hoch	5.20	47.—
30—40 „ „	6.—	53.—

Pinus montana mughus, schöne, volle Pflanzen, zur Bepflanzung von Balkonkästen bestens geeignet

20—30 cm hoch per 10 St. RM. 6.50, per 100 St. RM. 60.—

Koniferen (Nadelhölzer)

Sämtliche Koniferen sind regelmäßig verpflanzt, gut garniert und haben feste Wurzelballen. Die Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand herausgenommen. Da der Ballen während des Transportes leicht etwas austrocknet, die Pflanzen aber, wenn sie erst ballentrocken geworden sind, oftmals nicht gut anwachsen, **sind Koniferen vor dem Pflanzen durchdringend zu wässern (am besten den Ballen am Pflanzloch eine Zeitlang in ein Gefäß mit Wasser stellen) und beim Pflanzen einzuschlämmen.** Die Ballentücher, in die die Pflanzenballen eingebunden werden, sind **nicht** abzunehmen, sondern mit in die Erde zu bringen.

Zeichenerklärung: H = für Heckenpflanzung geeignet, St = für Steingärten etc. geeignet, R = rauchharte Koniferen, für Industriegegenden besonders geeignet, S = für schattige Lagen und als Unterholz geeignet.

		Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Abies, Tanne, Edeltanne					
arizonica, siehe A. lasiocarpa arizonica					
balsamea, Balsamtanne		40—60	1.—	9.—	80.—
		60—80	1.20	11.—	100.—
		80—100	1.75	16.—	145.—
		100—125	2.20	20.—	—
		175—200	4.80	—	—
		250—300	7.—	—	—
brachyphylla, Nikkotanne		40—60	1.95	17.50	—
		60—80	2.90	26.50	240.—
		100—125	6.40	58.50	535.—
		150—175	11.50	105.—	—
		175—200	15.—	135.—	—
		200—225	21.—	190.—	—
concolor, kalifornische Weißtanne	R	40—60	1.95	17.50	—
		60—80	2.90	26.50	240.—
		80—100	4.40	—	—
		100—125	6.40	—	—
		175—200	20.—	180.—	—
		200—225	24.—	—	—
		225—250	32.—	—	—
concolor violacea, aus Veredlungen gezogen	R	40—60	4.70	—	—
		60—80	6.—	—	—
		80—100	8.—	—	—
		100—125	10.50	—	—
Fraseri, Fraser's Balsamtanne		60—80	1.35	12.—	—
		80—100	1.80	16.—	—
		100—125	2.20	20.—	180.—
		175—200	4.80	—	—
lasiocarpa arizonica (A. arizonica), Korksilbertanne	R	60—80	3.60	—	—
		80—100	4.80	—	—
		100—125	6.50	60.—	—
		125—150	8.—	73.—	—
		150—175	9.30	—	—
		175—200	12.—	—	—
Mariesii, Mariestanne		60—80	3.—	—	—
		80—100	4.40	—	—
		100—125	6.40	—	—
nobilis, Weiß- oder Silbertanne		150—175	13.50	—	—
		175—200	16.—	—	—
		200—225	20.—	—	—
nobilis glauca	R	100—125	10.50	—	—
		125—150	13.50	—	—
Nordmanniana, Nordmannstanne		60—80	2.90	26.50	—
		80—100	4.40	40.—	—
		125—150	8.50	80.—	—
		150—175	11.50	105.—	—
		175—200	15.—	135.—	—

		Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Abies (Fortsetzung)					
sachalinensis		80—100	4.40	—	—
		100—125	6.40	—	—
		125—150	8.50	—	—
		150—175	12.—	—	—
		175—200	16.—	—	—
sibirica, sibirische Tanne		40—60	1.95	—	—
		60—80	2.90	—	—
Veitchii, Veitchs Weißtanne		100—125	6.40	—	—
		125—150	8.50	—	—
		150—175	11.50	—	—
		175—200	16.—	—	—
		250—275	32.—	—	—
		275—300	40.—	—	—
Buxus, siehe „Laubhölzer"					
Cedrus, Zeder					
atlantica glauca, intensiv blaue bis stahlblaue Form der Atlas-Zeder		40—60	2.90	26.50	—
		60—80	4.40	40.—	—
		80—100	5.80	53.—	—
deodara, Himalaja-Zeder		40—60	2.90	26.50	—
		60—80	4.40	40.—	—
deodara aurea		30—40	2.90	—	—
		40—60	4.—	—	—
Chamaecyparis, Lebensbaum-Zypresse					
Laws. Alumii	H	40—60	1.45	13.—	—
		60—80	1.95	17.50	—
		80—100	2.55	23.50	—
Laws. Fletcheri	St	20—30	1.75	16.—	145.—
		30—40	2.55	23.50	215.—
		40—60	3.—	27.50	250.—
Laws. forsteckensis	St	15—20	2.90	26.50	240.—
		20—25	3.60	33.—	300.—
		25—30	4.40	40.—	360.—
Laws. minima glauca	St	20—30	2.90	26.50	—
		30—40	3.60	—	—
Laws. nana compacta	St	15—20	2.20	—	—
		20—30	2.90	—	—
Laws. versicolor		40—60	1.45	13.—	—
Laws. Wisselii		30—40	2.—	18.—	—
nutkaensis glauca	R	40—60	2.65	—	—
		60—80	3.20	29.—	—
		80—100	4.—	36.—	—
		100—125	5.30	48.—	—
nutkaensis pendula		40—60	3.55	32.—	—
		60—80	4.40	40.—	—
		80—100	5.80	53.—	—
obtusa filicoides	St	20—30	4.—	36.—	—
obtusa gracilis		30—40	1.95	—	—
		40—60	2.65	24.—	—
obtusa nana gracilis	St	15—20	2.65	24.—	215.—
		20—25	3.20	29.—	265.—
		25—30	4.—	36.—	—
obtusa pygmaea	St	15—20	2.20	20.—	—
		20—30	2.90	26.50	240.—
		30—40	4.—	36.—	—
pisifera	H	40—60	1.—	9.—	80.—
		60—80	1.20	11.—	100.—
		80—100	1.45	13.—	—
		100—125	1.95	17.50	—
		200—225	5.30	48.—	—
		225—250	6.40	58.50	—

		Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Chamaecyparis (Fortsetzung)					
pisifera aurea	H	40—60	1.45	—	—
		125—150	4.—	—	—
		150—175	4.80	—	—
		175—200	5.80	—	—
		200—225	9.20	—	—
		250—300	14.50	—	—
		300—350	17.—	—	—
pisifera filifera	R	40—60	1.75	16.—	—
		60—80	2.65	24.—	—
		150—175	8.50	—	—
		200—250	14.—	—	—
pisifera filifera aurea	St	20—30	2.20	20.—	—
		30—40	2.90	26.50	—
		40—50	4.40	—	—
		50—60	5.90	—	—
pisifera filifera nana	St	20—30	2.90	26.50	—
		30—40	3.60	33.—	—
pisifera plumosa	H,R	40—60	1.20	11.—	100.—
		60—80	1.45	13.—	120.—
		80—100	1.95	17.50	—
		100—125	2.40	22.—	—
		125—150	3.20	—	—
		200—225	6.40	—	—
		225—250	7.—	—	—
pisifera plumosa argentea		40—60	1.45	13.—	—
pisifera plumosa aurea	H	30—40	1.20	11.—	100.—
		40—60	1.45	13.—	120.—
		60—80	1.95	17.50	—
		150—175	4.80	—	—
pisifera squarrosa	H,R	40—60	1.65	15.—	—
		60—80	2.40	22.—	—
		80—100	3.20	29.—	—
pisifera squarrosa aurea		30—40	1.35	12.—	—
pisifera sulphurea	St	40—60	1.45	13.—	—
		250—300	14.50	—	—
		300—350	17.—	—	—
Ginkgo biloba, Fächerbaum, Ginkgobaum		125—150	2.90	26.50	—
		150—175	3.60	33.—	—
		175—200	4.80	44.—	—
Juniperus, Wacholder					
chinensis Pfitzeriana aufgebundene Pflanzen	H,St, R,S	40—60	2.95	26.50	240.—
		60—80	4.—	36.50	335.—
		80—100	5.60	—	—
		100—125	6.50	—	—
Extra breite Pflanzen		100—125	12.50	115.—	—
		125—150	14.50	135.—	—
		150—175	17.—	—	—
		175—200	20.—	180.—	—
		200—225	29.—	—	—
Natürlich gewachsene, breitliegende Pflanzen, Breite		40—60	3.60	33.—	—
		60—80	5.30	48.—	—
		80—100	7.—	65.—	—
chinensis procumbens (J. japonica)	St	20—30	2.90	26.50	—
		60—80	5.30	48.—	—
		80—100	6.50	60.—	—
chinensis procumbens alba	St	30—40	4.30	39.—	—
chinensis procumbens aurea (J. japonica aurea)	St	30—40	4.30	39.—	—
		40—50	5.30	48.—	—
		50—60	6.50	—	—
		60—70	8.—	—	—
		70—80	8.50	—	—
communis, gemeiner Wacholder	R,S	30—40	1.95	16.50	160.—
		40—60	2.40	22.—	200.—
		60—80	3.20	29.—	265.—
		125—150	5.80	53.—	—
		150—175	7.80	73.—	—
mit Topfballen		30—40	1.65	15.—	135.—
		40—60	1.95	17.50	160.—

		Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Juniperus (Fortsetzung)					
communis aureo-spica (J. nana can. aurea), Breite	St	30—40	3.20	—	—
"		40—60	4.40	40.—	—
communis compressa	St	20—30	2.65	24.—	—
communis depressa (J. nana canadensis) . . Breite	St	20—30	2.65	24.—	—
"		30—40	3.20	29.—	—
"		40—50	4.40	40.—	—
communis hibernica, irischer Säulenwacholder . .		40—60	2.40	22.—	200.—
		60—80	3.20	29.—	265.—
		80—100	4.—	36.50	—
		100—125	4.80	44.—	—
		125—150	5.80	—	—
		150—175	8.—	—	—
communis montana (J. comm. nana) . . . Breite	St	20—30	2.65	24.—	—
"		30—40	3.20	29.—	—
communis suecica, schwedischer Säulenwacholder .		40—60	2.40	22.—	200.—
		60—80	3.20	29.—	265.—
		80—100	4.—	—	—
horizontalis (J. prostrata) . . . . . Breite	St	20—30	1.30	11.50	105.—
"		30—40	1.95	17.50	160.—
"		40—60	2.90	26.50	240.—
"		60—80	4.40	40.—	—
japonica und japonica aurea, siehe J. chin. procumbens und procumbens aurea					
nana canadensis, siehe J. comm. depressa					
nana can. aurea, siehe J. comm. aureo-spica					
prostrata, siehe J. horizontalis					
sabina femina, Sadebaum . . . . . Breite	St, R	30—40	2.55	23.50	215.—
"		40—60	3.55	32.50	295.—
"		60—80	4.80	44.—	—
"		80—100	6.50	—	—
"		100—125	7.50	70.—	—
sabina mas, männliche Form . . . . Breite	St, R	30—40	2.55	23.50	215.—
"		40—60	3.55	32.50	295.—
"		60—80	4.80	44.—	400.—
"		80—100	6.40	58.50	535.—
"		100—125	7.50	70.—	640.—
sabina humilis	St	30—40	2.65	—	—
		40—60	3.80	—	—
sabina prostrata	St	40—60	3.55	32.50	—
		60—80	4.80	—	—
sabina tamariscifolia, echt . . . . . Breite	St	20—30	2.65	24.—	220.—
"		30—40	3.20	29.—	265.—
"		40—50	4.80	44.—	400.—
"		60—70	6.50	—	—
squamata Meyeri	St	30—40	3.20	29.—	265.—
		40—50	4.80	44.—	400.—
		60—70	7.—	65.—	—
		70—80	9.80	93.—	—
		80—100	11.—	105.—	—
squamata Wilsonii	St	30—40	3.20	29.—	—
virginiana Cannartii		125—150	8.—	—	—
virginiana glauca	R	40—60	2.90	26.50	—
		60—80	4.—	36.—	—
		80—100	5.20	47.—	—
		100—125	5.80	53.—	—
		125—150	7.80	73.—	—
		150—175	10.50	100.—	—
		175—200	13.50	120.—	—
virginiana horizontalis . . . . . Breite		40—60	4.40	40.—	—
virginiana Schottii	R	125—150	8.—	—	—
virginiana tripartita . . . . . Breite	St	40—60	2.90	26.50	—
"		60—80	3.60	33.—	300.—
"		80—100	5.80	53.—	—
Larix, Lärche					
decidua (L. europaea), gemeine europäische Lärche	H, R	80—100	1.20	11.—	100.—
		100—150	1.65	15.—	135.—
		200—250	3.65	33.50	—
leptolepis, japanische Lärche	H, R	150—200	2.75	25.—	225.—
		200—250	3.65	33.50	305.—
		250—300	4.80	44.—	400.—
		300—400	5.80	53.—	480.—

		Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Picea, Fichte, Tanne					
bicolor (P. Alcockiana), Alcocks Fichte	R	40—60	2.55	23.50	—
		60—80	3.60	33.—	—
		80—100	4.40	40.—	—
		100—125	5.30	—	—
canadensis (P. alba), nordamerikanische Weißfichte	H, R	60—80	1.30	11.50	105.—
		80—100	1.65	15.—	135.—
		100—125	1.95	17.50	160.—
		125—150	2.40	22.—	200.—
		150—175	3.20	29.—	—
Engelmannii	R	80—100	5.30	—	—
		100—125	6.40	58.50	—
		125—150	7.80	73.—	—
		150—175	9.20	87.—	—
excelsa, gemeine Fichte oder Rottanne	H, R	40—60	0.85	7.50	67.—
Weniger regelmäßig gewachsene Pflanzen für Hecken, Gruppen usw. geeignet, 33⅓ % billiger! Topf- und Balkonfichten, siehe „Topffichten", Pflanzen ohne Ballen für Hecken, mehrmals verpflanzt und 3—4jährig verpflanzt, siehe „Junggehölze"		60—80	1.15	10.50	93.—
		80—100	1.45	13.—	120.—
		100—125	1.95	17.50	160.—
		125—150	2.40	22.—	200.—
		150—175	3.20	29.—	265.—
		175—200	4.—	36.50	335.—
excelsa Clanbrasiliana	St	20—30	2.40	22.—	—
		30—40	3.20	29.—	—
		50—60	4.80	—	—
excelsa compacta	St	20—30	2.40	22.—	—
		30—40	3.20	29.—	—
excelsa Gregoryana Breite	St	20—30	2.40	22.—	—
		30—40	3.20	29.—	—
excelsa inversa, Trauer- oder Hängefichte		40—60	3.60	33.—	—
		60—80	4.70	—	—
		80—100	6.50	60.—	—
		100—125	8.50	—	—
excelsa Maxwellii Breite	St	20—30	2.40	22.—	—
"		30—40	3.20	29.—	—
"		40—50	4.—	36.—	—
excelsa Merkii Breite	St	20—30	2.40	22.—	—
"		30—40	3.20	29.—	—
excelsa microsperma Breite	St	20—30	2.40	22.—	—
"		40—50	4.—	—	—
"		50—60	4.80	—	—
excelsa nana	St	20—30	2.40	22.—	—
excelsa nidiformis Breite	St	30—40	3.20	29.—	—
"		40—50	4.—	—	—
excelsa Ohlendorffii Breite	St	20—30	2.40	22.—	—
"		30—40	3.20	29.—	—
excelsa parviformis	St	20—30	2.40	22.—	—
excelsa procumbens Breite	St	20—30	2.40	22.—	—
excelsa pumila Breite	St	15—20	1.80	16.—	—
excelsa pumila glauca Breite	St	20—30	2.40	22.—	—
"		30—40	3.20	29.—	—
excelsa pumila nigra Breite	St	20—30	2.40	22.—	—
"		30—40	3.20	29.—	—
"		40—50	4.—	—	—
excelsa pygmaea Breite	St	20—30	2.40	22.—	200.—
"		30—40	3.20	29.—	265.—
"		40—50	4.—	36.—	—
"		70—80	8.—	—	—
excelsa Remontii	St	20—30	3.20	29.—	—
		30—40	4.—	36.—	—
		40—50	5.30	48.—	—
omorika, Omorikafichte, serbische Fichte	H, R	40—60	1.—	9.—	80.—
		60—80	1.65	15.—	135.—
		80—100	2.40	22.—	200.—
		100—125	3.20	29.—	265.—
		125—150	4.50	40.—	375.—
		150—175	5.80	53.—	480.—
		175—200	7.—	65.—	—
		200—250	9.—	85.—	—
		250—300	13.—	125.—	—
orientalis, morgenländische Fichte	S	20—30	0.85	7.50	67.—
orientalis gracilis compacta	St	20—30	2.90	26.50	—
		40—50	4.80	44.—	—
		50—60	5.80	53.—	—

		Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Picea (Fortsetzung)					
pungens, Stechfichte	H, R	40—60	1.—	9.—	80.—
		60—80	1.15	10.50	93.—
Pflanzen ohne Ballen zum Eintopfen, siehe „Topffichten"		80—100	1.75	16.—	—
pungens glauca, Blaufichte, aus Samen gezogene, ausgesucht blaugefärbte Pflanzen	H, R	40—60	2.55	23.50	215.—
		60—80	4.—	36.50	335.—
		80—100	5.30	48.—	440.—
Pflanzen mit Fehlern, für Gruppen geeignet, sind 40 % billiger!		100—125	6.40	58.50	—
		125—150	7.70	—	—
		175—200	11.70	—	—
Pflanzen ohne Ballen zum Eintopfen, siehe „Topffichten"		200—225	17.—	—	—
		225—250	21.50	—	—
		250—300	28.—	270.—	—
		300—350	34.—	330.—	—
pungens glauca Kosteri, Blaufichte, Veredlungen		40—50	4.80	44.—	400.—
		50—60	5.80	53.—	—
		60—70	7.—	—	—
Pflanzen mit Fehlern, für Gruppen geeignet, sind 40 % billiger!		80—100	10.50	100.—	—
		100—125	13.—	125.—	1200.—
		125—150	17.—	160.—	—
		150—175	21.—	200.—	—
		175—200	25.—	240.—	—
		200—225	33.—	320.—	—
		225—250	40.—	—	—
		250—300	53.—	—	—
pungens glauca Vuykii		60—70	7.—	65.—	—
		70—80	8.—	75.—	—
		80—100	10.50	100.—	—
		100—125	13.—	125.—	1200.—
		125—150	17.—	160.—	—
		150—175	21.—	200.—	—
		175—200	25.—	—	—
sitchensis, Sitkafichte	H	100—125	1.95	17.50	—
		125—150	2.40	22.—	—
		150—175	3.20	29.—	—
		175—200	4.—	36.50	—
Pinus, Kiefer oder Föhre					
cembra, Zürbelkiefer	R	40—60	1.95	17.50	160.—
		60—80	3.20	29.—	265.—
		80—100	4.80	44.—	—
		100—125	6.40	—	—
contorta Murrayana, Küstenkiefer		125—150	2.90	26.50	—
		175—200	5.30	—	—
edulis, Nußkiefer		30—40	1.45	13.—	—
		40—60	2.40	21.—	—
excelsa, Tränenkiefer		40—60	1.65	15.—	—
		60—80	2.25	20.50	—
		80—100	2.90	26.50	—
		100—125	3.60	—	—
flexilis, Nevada-Zürbelkiefer		80—100	4.80	44.—	—
		100—125	6.40	58.50	—
laricio austriaca, siehe P. nigra austriaca					
leucodermis, Schlangenhautkiefer		40—60	3.35	32.—	290.—
		60—80	5.30	48.—	—
montana, Berg- oder Krummholzkiefer,	H, R	20—30	1.—	9.—	80.—
Höhe oder Breite		30—40	1.30	11.50	105.—
" " "		40—50	1.95	17.50	160.—
" " "		50—60	2.40	22.—	200.—
" " "		60—80	3.20	29.—	265.—
" " "		100—125	4.80	—	—
" " "		125—150	5.80	—	—
" " "		150—200	16.—	—	—
montana mughus Breite	H, R	20—30	1.20	11.—	100.—
"		30—40	1.65	15.—	135.—
"		40—50	2.40	22.—	200.—
"		50—60	2.90	26.50	240.—
"		60—80	4.—	36.50	335.—
"		80—100	4.80	—	—
montana pumilio Breite	St, R	20—30	1.65	15.—	135.—
"		30—40	2.20	20.—	180.—
"		40—50	3.20	29.—	265.—
"		50—60	4.40	40.—	360.—

		Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Pinus (Fortsetzung)					
nigra austriaca (P. laricio austriaca), österreichische Schwarzkiefer	R	40—60	2.40	22.—	200.—
		60—80	4.—	36.50	335.—
		80—100	4.80	44.—	400.—
		100—125	6.40	58.50	—
		125—150	7.70	—	—
		150—175	9.—	—	—
		225—250	18.50	—	—
parviflora glauca, blaue Mädchenkiefer		40—50	4.—	36.—	—
		50—60	5.30	48.—	—
		60—80	7.—	65.—	—
		80—100	8.50	—	—
peuce, rumelische Weymouthskiefer		40—60	2.40	22.—	200.—
		60—80	3.20	29.—	265.—
		80—100	4.80	44.—	400.—
		100—125	6.40	58.50	—
silvestris, gemeine Kiefer, verpflanzte Baumschulware		60—80	2.40	22.—	200.—
		80—100	3.20	29.—	265.—
		100—125	4.40	40.—	360.—
		125—150	5.60	51.—	465.—
silvestris Watereriana	St	30—40	3.55	32.50	285.—
		40—60	5.30	48.—	440.—
		60—80	7.—	65.—	—
strobus, Weymouthskiefer		40—60	0.85	7.50	—
		60—80	1.15	10.50	93.—
		80—100	1.45	13.—	120.—
		100—125	1.95	17.50	160.—
		125—150	2.90	26.50	—
		200—250	6.40	—	—
Pseudotsuga, Douglastanne					
taxifolia caesia	R	60—80	1.30	11.50	105.—
		80—100	1.75	16.—	140.—
		100—125	2.40	22.—	200.—
		125—150	3.20	29.—	265.—
		150—175	4.—	36.50	335.—
		175—200	4.80	44.—	400.—
		200—250	6.—	—	—
		250—300	7.—	—	—
taxifolia glauca	R	100—125	2.40	22.—	200.—
		125—150	3.20	29.—	265.—
		150—175	4.—	36.50	335.—
		175—200	4.80	44.—	400.—
		200—250	6.—	55.—	—
taxifolia glauca (Veredlungen)	R	40—60	2.20	20.—	—
		60—80	2.90	26.50	—
taxifolia glauca pyramidalis	R	40—60	2.20	20.—	—
		60—80	2.90	26.50	—
Sciadopitys verticillata, japanische Schirmtanne		40—60	6.70	—	—
		60—80	10.—	—	—
Sequoia (Wellingtonia) **gigantea**, Mammutbaum, in Töpfen		20—30	1.75	16.—	145.—
		30—40	2.40	22.—	200.—
Taxodium distichum, Sumpfzypresse	R	40—60	2.—	18.—	—
Taxus, Eibe					
		40—50	Eigene Bestände erfroren, Auslandsware zur Lieferung Frühjahr 1941 — Preise auf Anfrage		
baccata, geschnittene Büsche mit Ballen, volle, breite Ware, bis unten voll garniert		50—60			
		60—70			
		70—80			
		125—150	7.—	65.—	—
		150—175	11.70	112.—	—
baccata aureo-variegata Breite	St	30—40	2.—	—	—
		40—60	2.65	24.—	—
baccata Dovastonii aureo-var. "	St	40—60	2.65	24.—	—
baccata elegantissima	St	30—40	2.—	18.—	—
		40—60	2.65	24.—	—
		60—80	4.40	40.—	—

		Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Taxus (Fortsetzung)					
baccata fastigiata (T. hibernica), irländischer Säulentaxus	R, S	60—70	4.80	44.—	400.—
		70—80	5.80	53.—	480.—
		80—90	7.—	65.—	600.—
		90—100	8.—	75.—	700.—
Aus Stecklingen gezogene Pflanzen!		100—125	9.—	85.—	800.—
		125—150	10.50	100.—	—
		200—225	22.—	—	—
bacc. fastigiata aureo-variegata		60—70	4.80	44.—	400.—
		70—80	5.80	53.—	480.—
		80—90	7.—	65.—	—
		90—100	8.—	75.—	—
		100—125	9.20	87.—	—
		125—150	10.50	100.—	—
		150—175	13.50	120.—	—
baccata Hessei	H,R,S	100—125	4.80	44.—	—
bacc. pendula		30—40	1.80	16.—	—
baccata repandens Breite		40—50	3.60	33.—	300.—
"		50—60	4.40	40.—	360.—
"		60—70	5.30	48.—	440.—
baccata Washingtonii		40—60	2.65	24.—	—
cuspidata	H,R,S	50—60	1.45	—	—
		60—70	1.80	—	—
		70—80	2.25	—	—
		80—90	2.65	—	—
		100—125	4.80	—	—
cuspidata nana (T. brevifolia)	R,St	30—40	3.60	33.—	—
		40—50	4.40	40.—	—
		50—60	5.30	48.—	—
		60—70	5.80	53.—	—
		70—80	7.—	65.—	—
		80—100	9.20	87.—	—
Thuja, Lebensbaum					
gigantea aureo-variegata	H	60—80	1.35	12.—	—
gigantea aurescens	H	40—60	1.—	9.—	80.—
		60—80	1.30	11.50	105.—
		80—100	1.95	17.50	160.—
		100—125	2.40	22.—	200.—
		175—200	4.80	44.—	—
Mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, ohne Ballen		30—40	0.55	5.—	44.—
		40—60	0.65	6.—	53.—
gigantea elegantissima	H	40—60	1.—	9.—	80.—
		60—80	1.30	11.50	105.—
		80—100	1.95	17.50	160.—
		100—125	2.40	22.—	—
		125—150	2.90	26.50	—
		150—175	4.—	36.—	—
occidentalis, abendländischer Lebensbaum	H,R	40—60	0.90	8.—	70.—
Breite, mehrfach geschnittene, vollgarnierte Pflanzen, Qualitätsware!		60—80	1.10	10.—	85.—
		80—100	1.20	11.—	—
		100—125	1.65	15.—	135.—
		125—150	2.20	20.—	—
		175—200	3.—	27.50	—
		200—225	3.60	33.—	300.—
		225—250	4.—	36.—	330.—
		250—275	4.80	44.—	400.—
		300—350	7.70	72.—	665.—
		350—400	9.80	93.—	—
		400—450	11.70	112.—	—
		450—500	14.50	140.—	—
Mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, ohne Ballen					
1000 Stück RM. 180.—		30—40	0.35	2.70	20.—
1000 " " 250.—		40—60	0.35	3.25	27.50
(Jüngere 3—4jährige Ware, siehe „Junggehölze")					
occ. alba	H	40—60	1.—	9.—	—
occ. columna	H	40—60	1.—	9.—	—
		60—80	1.30	11.50	—
		80—100	1.95	17.50	—
		100—125	2.40	22.—	—
		125—150	2.90	26.50	—
		150—175	4.—	36.—	—

		Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Thuja (Fortsetzung)					
occ. Ellwangeriana	H	40—60	1.—	9.—	—
		60—80	1.30	11.50	—
occ. Ellwangeriana elegantissima	H	40—60	1.10	10.—	—
		60—80	1.45	13.—	—
		80—100	1.95	17.50	—
occ. Ellwangeriana Rheingold	St	25—30	1.65	15.—	135.—
occ. fastigiata	H	40—60	1.10	10.—	87.—
		60—80	1.45	13.—	120.—
occ. globosa compacta	St	20—30	1.65	15.—	—
		30—40	2.40	22.—	—
occ. gracilis	H	40—60	1.—	9.—	—
		175—200	4.80	44.—	—
occ. Hoveyi	H	40—60	1.95	17.50	160.—
		60—80	2.40	—	—
		80—100	2.90	—	—
occ. lutea	R	60—80	2.40	22.—	—
		80—100	2.90	26.50	—
occ. pyramidalis	H	40—60	1.—	9.—	—
		60—80	1.10	10.50	—
		80—100	1.30	11.50	105.—
		100—125	1.75	16.—	145.—
		125—150	2.40	22.—	—
		150—175	2.90	26.50	—
occ. recurva nana Breite	St,R	20—30	1.65	15.—	135.—
occ. Riversii, mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, ohne Ballen		30—40	0.55	5.—	44.—
occ. Rosenthalii	H, R	30—40	0.85	7.50	67.—
		40—60	1.10	10.—	87.—
		60—80	1.45	13.—	120.—
		125—150	3.35	30.50	280.—
		150—175	4.40	40.—	—
		175—200	5.80	53.—	—
occ. spiralis	H	250—275	9.20	87.—	—
		275—300	10.50	100.—	—
		500—600	20.—	180.—	—
occ. Vervaeneana		60—80	1.30	12.—	—
occ. Wagneriana (Th. occ. Versmannii)	H	40—60	1.—	9.—	—
		60—80	1.30	11.50	105.—
		80—100	1.95	—	—
occ. Wareana	H	40—60	1.—	9.—	—
		60—80	1.30	11.50	—
Standishii		80—100	4.—	36.—	—
		100—125	4.80	44.—	—
Thujopsis dolabrata, japanischer Lebensbaum	R	30—40	1.75	16.—	—
		40—50	2.55	23.50	—
		50—60	4.—	36.—	—
		60—80	5.30	48.—	440.—
		80—100	7.—	—	—
		100—125	8.—	—	—
Tsuga, Hemlockstanne					
canadensis, kanadische Hemlockstanne	H, S	40—60	1.—	9.—	80.—
		60—80	1.65	15.—	135.—
		80—100	2.40	22.—	—
		100—125	3.20	29.—	—
		125—150	4.80	44.—	—
		150—175	7.—	65.—	—
		175—200	9.—	85.—	—
caroliniana		100—125	4.70	42.50	—
		125—150	6.—	—	—
diversifolia		40—60	1.80	16.—	—
		80—100	4.—	36.—	—
		100—125	4.70	42.50	—
		125—150	6.50	60.—	—
		150—175	8.50	80.—	—
Mertensiana		30—40	0.90	8.—	—
		60—80	1.65	15.—	—
Pattoniana		40—60	4.80	44.—	—
Wellingtonia gigantea, siehe Sequoia gigantea					

Junggehölze zur Weiterkultur und Forstpflanzen

Zeichenerklärung: Abl. = Ableger, Abr. = Abriß, Abs. = Absenker, b = bewurzelt, kr. pik. = krautartig pikiert, m/m v. = mehrmals verpflanzt, S. = Sämling, St. = Steckling, v. = verpflanzt, Vg. = Veredlung.

H = für Heckenpflanzung geeignet
St = für Steingärten etc. geeignet
R = Rauchharte Pflanzen, für Industriegegenden besonders geeignet
S = für schattige Lage und als Unterholz geeignet
i = immergrünes Gehölz
B = Bienenweidepflanze

Die mit einem F bezeichneten Pflanzenarten und Größen sind Forstpflanzen. Für diese gelten die Verkaufs- und Versandbedingungen gemäß Absatz 23 meiner Lieferungsbedingungen.

Bei Abnahme von weniger als 50 Stück einer Sorte erhöht sich der Hundertstückpreis um 25 %. — Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

	Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
I. Beerenobst				
Haselnüsse in besten, großfrüchtigen Sorten . .	1j. b. Abs.	50—80	33.—	—
Himbeeren Lloyd George und Preußen . . .	1j. b. Abr.	50—80	8.20	67.—
„ Deutschland	1j. b. Abr.	50—80	13.—	115.—
Johannisbeeren:				
Rotfrüchtige in den Sorten: Fays Fruchtbare, Rote Holländische	1j. b. St.	20—40		geräumt
Schwarzfrüchtige in den Sorten: Bang up, Goliath, Lees Schwarze, Schwarze Traube	1j. b. St.	40—60	6.20	47.—
Weißfrüchtige in den Sorten: Bar le Duc, Weiße Holländische, Weiße Versailler	1j. b. St.	40—60	6.20	47.—

II. Junge Laubhölzer

In Sorten meiner Wahl liefere ich junge Ziergehölze:

1000 Stück	in 20—30 Sorten	RM. 67.—	per 1000 Stück	
1000 „	„ 40—50 „	„ 93.—	„ 1000	„
2-3000 „	„ 40—50 „	„ 80.—	„ 1000	„
4000 „ und mehr	„ 40—50 „	„ 67.—	„ 1000	„

			Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer, Ahorn						
campestre, Feldahorn		H,R,S	1j. S.	20—40	4.20	27.—
			1j. S.	40—60	5.50	40.—
			2j. v. S.	40—65	8.80	73.—
			2j. v. S.	65—100	11.—	93.—
			3j. v. S.	100—140	15.—	135.—
aus halbweitem Stand, buschig			m/m. v.	80—100	33.—	300.—
" " " "			m/m. v.	100—125	40.—	360.—
ginnala		H, R	1j. S.	20—40	4.20	27.—
			1j. S.	40—60	4.80	33.—
			2j. v. S.	40—65	6.80	53.—
			2j. v. S.	65—100	8.20	67.—
			3j. v. S.	100—140	11.—	93.—
negundo, Eschenahorn			1j. S.	65—100	4.20	27.—
			2j. v. S.	65—100	4.80	33.—
			2j. v. S.	100—140	5.50	—
platanoides, Spitzahorn	F	B	1j. S.	20—40	1.50	12.—
	F		1j. S.	40—60	2.50	18.—
pseudoplatanus, Weiß- oder Bergahorn	F	B	1j. S.	20—40	1.50	12.—
	F		1j. S.	40—60	2.50	18.—
	F		3j. v. S.	65—100	5.60	45.—
	F		3j. v. S.	100—140	8.—	60.—
			4j. v. S.	140—180	13.50	120.—
			4j. v. S.	180—220	20.—	180.—
pseudoplatanus purpurascens			3j. v. S.	65—100	9.50	—
			3j. v. S.	100—140	14.—	—
saccharinum (A. dasycarpum), Silberahorn		B	3j. v. S.	65—100	11.—	93.—
			3j. v. S.	100—140	12.20	107.—
Aesculus hippocastanum, Roßkastanie		B	1j. S.	10—25	4.80	33.—
			3j. v. S.	40—65	11.50	100.—
			3j. v. S.	65—100	14.20	127.—
			4j. v. S.	100—140	17.—	155.—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum		R, B	2j. v. S.	65—100	6.80	53.—
			3j. v. S.	100—140	8.20	67.—
Alnus, Erle						
glutinosa, Rot- oder Schwarzerle	F	S, B	1j. S.	7—15	1.—	8.—
	F		1j. S.	15—30	1.50	12.—
	F		2j. v. S.	40—65	3.—	24.—
	F		2j. v. S.	65—100	4.40	35.—
	F		2j. v. S.	100—140	5.50	45.—
incana, Weißerle	F	S, B	1j. S.	7—15	1.—	8.—
	F		1j. S.	15—30	1.50	12.—
	F		2j. v. S.	40—65	3.—	24.—
	F		2j. v. S.	65—100	4.40	35.—
	F		2j. v. S.	100—140	5.50	45.—
Amorpha fruticosa, Bastardindigo		B	2j. v. S.	65—100	6.20	47.—
			3j. v. S.	100—140	8.20	67.—
Ampelopsis, siehe Parthenocissus						
Artemisia abrotanum, Beifuß			2j. v. St.	30—50	8.70	—
Azalea, Azalee, Felsenstrauch						
mollis			2j. S.	—	6.80	53.—
			3j. v. S.	10—15	13.50	120.—
			4j. v. S.	15—25	22.—	200.—
pontica			3j. v. S.	10—15	14.—	—
			4j. v. S.	15—25	22.—	200.—

		Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Berberis, Berberitze					
brevipaniculata	B	2j. v. S.	20—40	6.80	—
buxifolia nana	H,St,	2j. v. St.	8—15	8.20	67.—
	S,i	3j. v. St.	12—25	12.20	107.—
stenophylla	H,S,iB	2j. v. St.	10—20	33.—	—
Thunbergii	H,B	1j. S.	10—20	4.20	27.—
		2j. v. S.	20—40	6.80	53.—
		3j. v. S.	40—60	12.20	107.—
Thunbergii atropurpurea	H,B	1j. S.	8—12	4.80	33.—
		1j. S.	12—25	5.50	40.—
		2j. v. S.	20—40	7.50	60.—
		3j. v. S.	40—60	15.—	135.—
verruculosa	St,S				
	i, B	2j. v. St.	8—12	33.—	—
vulgaris	H,R,B	1j. S.	10—20	4.20	27.—
		2j. v. S.	20—40	6.80	53.—
		3j. v. S.	40—60	9.50	80.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	50—80	24.—	215.—
vulgaris atropurpurea	H, B	1j. S.	10—20	4.20	27.—
		2j. v. S.	20—40	6.80	53.—
		3j. v. S.	40—60	9.50	80.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	50—80	24.—	215.—
Betula, Birke					
lutea, Gelbbirke		2j. v. S.	40—65	6.20	47.—
		3j. v. S.	65—100	7.50	60.—
papyrifera (B. papyracea), Papierbirke	R	2j. v. S.	40—65	6.20	47.—
		2j. v. S.	65—100	7.50	60.—
		3j. v. S.	100—140	8.80	73.—
pubescens, Moorbirke	F H,R	1j. S.	7—15	1.10	9.—
	F	1j. S.	15—25	1.90	15.—
	F	2j. v. S.	40—65	4.—	32.—
	F	2j. v. S.	65—100	5.60	45.—
	F	3j. v. S.	100—140	7.50	60.—
verrucosa (B. alba), Sand- oder Weißbirke	F R	1j. S.	7—15	1.10	9.—
	F	1j. S.	15—25	1.90	15.—
	F	2j. v. S.	40—65	4.—	32.—
	F	2j. v. S.	65—100	5.60	45.—
	F	3j. v. S.	100—140	7.50	60.—
Buddleia, Buddleie					
albiflora (B. Hemsleyana)		1j. S.	40—60	4.80	33.—
		1j. v. S.	60—100	8.20	67.—
Davidii (B. variabilis)		1j. S.	40—60	4.80	33.—
		1j. v. S.	60—100	8.20	67.—
Davidii magnifica		1j. S.	40—60	4.80	33.—
		1j. v. S.	60—100	8.20	67.—
Davidii nanhoensis		1j. S.	40—60	4.80	33.—
		1j. v. S.	60—100	8.20	67.—
Davidii Veitchiana		1j. S.	40—60	4.80	33.—
		1j. v. S.	60—100	8.20	67.—
japonica		1j. S.	40—60	4.80	33.—
		1j. v. S.	60—100	8.20	67.—
Buxus, Buchsbaum					
japonica aurea	S,i	3j. v. St.	12—25	11.—	—
sempervirens (B. arborescens) ca. 8—12 cm breit	H,S,	m/m. v.	15—20	24.—	215.—
,, 10—15 ,, ,,	i,B	m/m. v.	20—25	29.—	265.—
,, 12—16 ,, ,,		m/m. v.	25—30	33.—	300.—
sempervirens arg.-marg.	i	3j. v. St.	8—15	11.—	—
sempervirens arg.-var. elegans	i	3j. v. St.	8—15	11.—	—
sempervirens aur.-var.	H,i,B	2j. v. St.	10—20	8.—	—
sempervirens Handsworthii	H,i,B	4j. v. St.	15—30	12.20	107.—
Calluna, Heidekraut	St,i,B				
vulgaris Alportii		3j. v. St.	—	24.—	215.—
vulgaris argentea		3j. v. St.	—	24.—	—
vulgaris elegantissima		3j. v. St.	—	24.—	—
vulgaris nana (C. vulgaris minima)		3j. v. St.	—	24.—	—

		Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	R	2j. v. S.	10—20	21.50	—
Campsis (Tecoma, Bignonia) **radicans**, Jasmintrompete		1j. S.	20—40	5.50	40.—
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	H	1j. S.	10—20	2.85	13.50
		1j. S.	20—40	3.50	20.—
		2j. v. S.	40—65	5.50	40.—
		3j. v. S.	65—100	6.80	53.—
		3j. v. S.	100—140	8.20	67.—
Carpinus, Weiß- oder Hainbuche					
betulus, gemeine Weiß- oder Hainbuche	F H,R,S	1j. S.	10—20	1.50	12.—
	F	1j. S.	20—40	2.20	18.—
	F	2j. S.	20—40	2.50	20.—
	F	2j. S.	40—65	4.20	34.—
	F	3j. v. S.	40—65	6.—	48.—
	F	3j. v. S.	65—100	9.40	75.—
		4j. v. S.	100—140	19.—	175.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	60—80	22.—	200.—
" " " "		m/m. v.	80—100	29.—	265.—
" " " "		m/m. v.	100—125	44.—	400.—
" " " "		m/m. v.	125—150	60.—	540.—
Castanea sativa (C. vesca), echte Kastanie, Marone	R	3j. v. S.	40—65	12.20	107.—
		3j. v. S.	65—100	15.—	135.—
Catalpa bignonioides (C. syringifolia), Trompetenbaum	R,B	2j. v. S.	40—65	10.—	—
Ceanothus americanus, Säckelblume	St	1j. S.	30—50	4.80	33.—
		3j. v. S.	40—65	7.50	60.—
Chaenomeles (Cydonia), Scheinquitte, japanische Quitte					
japonica (Ch. Maulei)	H,R, St,B	1j. S.	15—30	2.85	13.50
		1j. S.	30—50	4.20	27.—
		2j. v. S.	30—50	6.80	53.—
		3j. v. S.	40—65	8.20	67.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	30—50	24.—	215.—
lagenaria (Ch. japonica)	H,R,B	1j. S.	15—30	4.80	33.—
		2j. v. S.	30—50	7.50	60.—
		3j. v. S.	40—65	9.50	80.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	50—70	26.50	240.—
lagenaria umbilicata	B	1j. Vg.	40—70	26.50	—
Clematis, Waldrebe					
montana rubens	S	1j. S.	10—20	15.—	135.—
paniculata	S	1j. S.	5—10	9.50	80.—
tangutica	S	1j. S.	20—40	5.50	40.—
		2j. v. S.	40—65	9.50	—
vitalba	R,S	1j. S.	30—50	3.50	20.—
		1j. S.	50—80	4.20	27.—
		2j. v. S.	65—100	6.80	—
Colutea arborescens, Blasenstrauch	R,B	2j. v. S.	65—100	6.20	47.—
		2j. v. S.	100—140	7.50	60.—
Cornus, Hartriegel, Kornelkirsche					
alba	R,S	2j. v. S.	40—65	6.20	47.—
		2j. v. S.	65—100	6.80	53.—
		3j. v. S.	140—180	13.50	120.—
alba argenteo-marginata		2j. v. Abl.	20—40	16.—	—
alba flaviramea	S	2j. v. Abl.	40—70	14.—	—
alba sibirica (C. tatarica sibirica)	R,S	2j. v. Abl.	20—40	14.—	—
alba Spaethii		2j. v. Abl.	20—40	16.—	—
mas	H,R, S,B	1j. S.	10—20	8.20	67.—
		1j. S.	20—40	11.50	100.—
		2j. v. S.	20—40	26.50	240.—
		3j. v. S.	50—80	36.—	—
sanguinea	H,R,S	2j. v. S.	20—40	10.20	87.—
		2j. v. S.	40—65	11.50	100.—

		Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Corylus, Haselnuß					
avellana	H,R,	2j. v. S.	40—65	11.50	—
	S,B	2j. v. S.	65—100	13.50	—
		3j. v. S.	100—140	17.50	160.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	100—125	32.50	295.—
,, ,, ,, ,,		m/m. v.	125—150	36.—	330.—
,, ,, ,, ,,		m/m. v.	150—200	44.—	400.—
avellana atropurpurea	H,B,S	1j. b. Abs.	—	33.—	—
avellana Rotblättrige Zellernuß	H,B,S	1j. b. Abs.	—	33.—	—
avellana aurea	R,S,B	1j. b. Abs.	—	33.—	—
avellana laciniata	R,S	1j. b. Abs.	—	33.—	—
colurna, Baumhasel	R	2j. v. S.	40—65	11.—	—
Cotinus coggygria (Rhus cotinus), Perückenstrauch		1j. S.	20—40	7.50	60.—
Cotoneaster, Zwergmispel					
applanata, siehe C. Dielsiana					
bullata	H,B	2j. v. S.	40—65	8.80	73.—
		3j. v. S.	65—100	11.—	93.—
Dielsiana (C. applanata)	H,B	2j. v. S.	30—50	8.20	67.—
		2j. v. S.	50—80	9.50	80.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	60—100	24.—	215.—
divaricata	St,B	1j. S.	10—20	6.20	—
		2j. v. S.	30—50	8.80	—
		3j. v. S.	50—80	13.50	—
horizontalis	St,i,S,	1j. S.	—	7.50	60.—
	B,R	2j. v. S.	7—15	12.20	107.—
		3j. v. S.	20—30	24.—	215.—
moupinensis	H,B	3j. v. S.	65—100	9.50	—
praecox	St,B	1j. S.	—	7.50	60.—
		3j. v. S.	20—30	24.—	—
Simonsii	H,St,	1j. S.	8—15	6.20	—
	i,B	2j. v. S.	20—40	8.20	—
Crataegus, Dorn					
coccinea, Scharlachdorn	H,R,B	2j. v. S.	40—65	10.20	87.—
		3j. v. S.	65—100	12.20	—
monogyna, Weißdorn	H,R,	1j. S.	15—30	2.50	9.50
	S,B	1j. S.	30—60	3.10	16.—
4—6 mm Durchmesser		2j. S.	40—60	3.65	21.50
6—9 ,, ,,		2j. S.	50—90	4.70	32.—
4—6 ,, ,,		2j. v. S.	40—60	4.70	32.—
6—9 ,, ,,		3j. v. S.	60—90	5.80	43.—
9—12 ,, ,,		4j. v. S.	60—100	8.20	67.—
12—14 ,, ,,		4j. v. S.	80—120	11.50	100.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	80—120	24.—	215.—
Cydonia, siehe Chaenomeles					
Cytisus, Geißklee, Strauchgoldregen					
laburnum, siehe Laburnum vulgare					
nigricans	St,B	1j. S.	30—50	5.50	40.—
mit Topfballen		1j. S.	30—50	33.—	—
purpureus ,, ,,	St	1j. Vg.	20—40	60.—	—
scoparius (Genista scoparia), gemeiner Ginster . F	St,B	1j. S.	—	3.—	24.—
mit Topfballen		1j. S.	30—50	33.—	300.—
Daphne mezereum rubra, Seidelbast	St,R,S	2j. v. S.	8—12	12.20	107.—
		3j. v. S.	20—40	24.—	215.—

		Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Deutzia, Deutzie					
crenata-Formen, siehe D. scabra-Formen					
elegantissima fasciculata	H,St	2j. v. St.	15—30	11.—	—
gracilis	H,St	2j. v. St.	10—20	11.—	93.—
hybrida Mont-Rose	H	2j. v. St.	20—40	11.—	—
kalmiaeflora	H,St	2j. v. St.	15—30	11.—	—
Lemoinei	H,St	2j. v. St.	20—40	11.—	93.—
Lemoinei Boule rose	H,St	2j. v. St.	15—25	11.—	—
Lem. comp. Avalanche	H,St	2j. v. St.	20—40	11.—	93.—
Lem. comp. Boule de neige	H,St	2j. v. St.	15—30	11.—	—
magnifica	H	1j. b. St.	30—60	9.50	80.—
purpurascens (D. discolor purpurascens)	H,St	2j. v. St.	20—40	11.—	93.—
rosea (D. gracilis rosea)	H,St	2j. v. St.	20—40	11.—	93.—
rosea campanulata	H,St	2j. v. St.	20—40	11.—	93.—
rosea carminea	H,St	2j. v. St.	20—40	11.—	93.—
rosea eximia	H,St	2j. v. St.	20—40	11.—	93.—
rosea grandiflora (D. discolor grandiflora)	H,St	2j. v. St.	20—40	11.—	93.—
rosea multiflora (D. gracilis multiflora)	H,St	2j. v. St.	20—40	11.—	93.—
rosea venusta	H,St	2j. v. St.	15—30	11.—	93.—
scabra candidissima	H	1j. b. St.	30—60	9.50	80.—
scabra macrothyrsa	H	1j. b. St.	30—60	9.50	—
scabra Pride of Rochester	H	1j. b. St.	30—60	9.50	—
scabra rosea plena	H	1j. b. St.	30—60	9.50	80.—
scabra Watereri	H	1j. b. St.	30—60	9.50	80.—
Diervilla (Weigela), Weigelie					
in verschiedenen guten Sorten	S	1j. b. St.	20—40	15.—	—
Eva Rathke		2j. v. St.	20—40	32.—	—
Elaeagnus angustifolia, Ölweide	H,R	1j. S.	20—40	6.80	53.—
		1j. S.	40—60	7.50	60.—
		2j. v. S.	50—80	10.20	87.—
Erica, Schneeheide					
carnea (E. herbaceae)	H,St, i,B	3j. v. St.	8—12	24.—	215.—
carnea alba		3j. v. St.	8—12	24.—	—
carnea atropurpurea		3j. v. St.	8—12	24.—	—
carnea James Backhouse		3j. v. St.	8—12	24.—	—
carnea Stewartii		3j. v. St.	8—12	24.—	—
carnea Vivellii		3j. v. St.	8—12	24.—	215.—
carnea Winter Beauty		3j. v. St.	8—12	24.—	215.—
Evonymus, Spindelbaum					
europaea	H,R,S	2j. v. S.	30—50	11.—	93.—
		3j. v. S.	50—80	15.—	135.—
		3j. v. S.	80—100	20.—	180.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	60—100	29.—	265.—
nana Koopmannii	St,R, S,i	2j. v. St.	8—15	8.70	—
radicans	H,St, S,i	2j. v. St.	8—15	9.50	80.—
radicans argenteo-variegata	H,St, S,i	2j. v. St.	8—15	11.—	93.—
radicans vegeta	St,S,i	2j. v. St.	10—20	16.—	—

		Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Fagus silvatica, Rot- oder Waldbuche . . F	H,R,B	1j. S.	7—15	1.—	8.—
F		1j. S.	15—30	1.70	13.—
F		2j. v. S.	15—30	3.10	25.—
F		3j. v. S.	30—50	5.60	45.—
F		3j. v. S.	50—80	8.70	70.—
		4j. v. S.	80—120	20.—	180.—
Forsythia, Forsythie					
intermedia	H,B	1-2j. b. St.	20—40	11.—	93.—
intermedia densiflora	B	1-2j. b. St.	20—40	11.—	93.—
intermedia spectabilis	H,B	1-2j. b. St.	20—40	11.—	93.—
intermedia vitellina	H,B	1-2j. b. St.	20—40	11.—	93.—
suspensa Fortunei	B	2j. v. St.	30—50	18.—	—
suspensa Sieboldii	B	1-2j. b. St.	20—40	11.—	93.—
viridissima	H,S,B	1-2j. b. St.	20—40	11.—	93.—
Fraxinus, Esche					
excelsior, gemeine Esche . . . . . F	R	1j. S.	10—20	1.—	8.—
F		1j. S.	20—40	1.70	13.—
F		3j. v. S.	40—65	5.—	40.—
F		3j. v. S.	65—100	6.40	52.—
		4j. v. S.	100—140	11.—	91.—
Genista, Ginster					
scoparia, gemeiner Ginster, siehe Cytisus scoparius					
tinctoria, Färberginster	St	1j. S.	20—40	4.20	27.—
		1j. S.	40—60	4.80	33.—
mit Topfballen		1j. S.	30—50	33.—	—
Ginkgo biloba, siehe „Nadelhölzer"					
Gleditschia triacanthos, Christusdorn . . .	H,R	2j. v. S.	20—40	7.50	—
		3j. v. S.	65—100	9.50	80.—
Hamamelis virginiana, Zaubernuß		2j. v. S.	15—25	21.50	—
		3j. v. S.	20—40	29.50	—
Hippophaes rhamnoides, Sanddorn	H	1j. S.	10—20	4.20	27.—
		1j. S.	20—40	5.50	40.—
		2j. v. S.	30—50	9.50	80.—
		3j. v. S.	50—80	13.50	120.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	60—100	26.50	240.—
" " " "		m/m. v.	100—150	31.—	280.—
Holodiscus discolor ariaefolius (Spiraea ariaefolia), Scheinspiere	H,S,B	2j. v. S.	40—60	13.—	115.—
		3j. v. S.	60—100	15.—	135.—
Hydrangea, Hortensie					
arborescens grandiflora	S	2j. v. St.	15—30	18.—	—
paniculata grandiflora		2j. v. St.	20—40	17.50	160.—
petiolaris		2j. v. St.	10—20	24.—	—
Hypericum patulum Henryi, Johannisstrauch, Hartheu	St,S	1j. v. S.	8—15	11.50	100.—
Ilex, Stechpalme, Hülse					
aquifolium	H,St, R,S,i	1j. S.	—	6.80	53.—
		2j. v. S.	—	12.20	107.—
		4j. v. S.	20—40	33.—	—
crenata	H,St, R,i	4j. v. S.	12—20	16.—	—
Juglans regia, Walnuß		3j. v. S.	65—100	24.—	—
		4j. v. S.	100—140	29.—	—

		Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Kerria, Ranunkelstrauch					
japonica	H,S	2j. v. St.	20—40	11.50	100.—
japonica flore-pleno	H,S	2j. v. St.	20—40	20.—	180.—
Laburnum, Goldregen					
alpinum	R,S	1j. S.	20—40	6.20	—
vulgare	R,S	1j. S.	15—30	3.50	20.—
		1j. S.	30—50	4.80	33.—
		2j. v. S.	40—65	8.80	73.—
		2j. v. S.	65—100	11.50	100.—
		3j. v. S.	100—140	13.50	120.—
Watereri (L. Vossii)	R,S	1j. Vg.	50—80	33.—	—
Ligustrum, Liguster, Rainweide					
lodense	H,R,i	1j. b. St.	8—15	6.20	—
ovalifolium	H,R	1j. b. St.	15—30	4.20	27.—
mit 2—4 Trieben	S,i	2j. b. St.	30—50	6.20	47.—
,, 2—4 ,,		2j. b. St.	50—80	8.20	67.—
,, 2—4 ,,		2j. b. St.	80—100	9.50	80.—
vulgare	H,R,S	1j. b. St.	30—50	5.50	40.—
mit 2—4 Trieben		2j. b. St.	30—50	6.20	47.—
,, 2—4 ,,		2j. b. St.	50—80	8.20	67.—
,, 2—4 ,,		2j. b. St.	80—100	9.50	80.—
vulgare atrovirens	H,R,	1j. b. St.	15—30	6.80	53.—
mit 2—4 Trieben	S,i	2j. b. St.	30—50	11.50	100.—
,, 2—4 ,,		2j. b. St.	50—80	13.—	115.—
Lonicera, Heckenkirsche					
alpigena	H,R,B	2j. v. S.	15—30	12.—	—
		3j. v. S.	30—50	16.—	—
amoena alba	H,R,B	1j. b. St.	40—70	9.50	80.—
coerulea	H,R,B	3j. v. S.	30—50	11.—	93.—
japonica repens	i	2j. v. St.	15—30	15.—	—
Ledebourii	H,R,B	1j. b. St.	40—70	9.50	80.—
Morrowii	H,R,B	1j. b. St.	40—70	8.50	80.—
periclymenum, Geißblatt		3j. v. St.	80—120	67.—	—
pileata	H,St, R,i	2j. v. St.	15—25	11.—	93.—
Ruprechtiana	H,R,B	1j. b. St.	40—70	9.50	80.—
spinosa Albertii	H,St, R,B	1j. b. St.	20—40	11.—	—
tatarica	H,R, S,B	1j. b. St.	40—70	9.50	80.—
tatarica pulcherrima	H,R, S,B	1j. b. St.	40—70	9.50	—
tatarica rosea	H,R, S,B	1j. b. St.	40—70	9.50	80.—
xylosteum	H,R, S,B	1j. b. St.	40—70	9.50	80.—
yunnanensis	H,St, R,i	2j. v. St.	10—20	11.—	—
Lycium halimifolium (L. vulgare), Bocksdorn	H,R,B	1j. b. St.	40—65	9.50	80.—
		2j. b. St.	65—100	12.20	107.—
Mahonia aquifolium, Mahonie	H,St,R S,i,B	2j. S.	10—25	3.65	21.50
		2j. v. S.	12—25	4.80	33.—
		3j. v. S.	15—35	6.20	47.—
		4j. v. S.	20—45	7.50	60.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	25—40	20.—	180.—
Malus, Zierapfel, Kirschapfel,	B				
in Sorten wie: floribunda purpurea, purpurea Eleyi, Scheideckeri		1j. Vg.	40—80	26.50	—

		Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Morus alba, weißfrüchtige Maulbeere	H	2j. v. S.	30—60	6.80	53.—
		3j. v. S.	60—100	8.20	67.—
Parthenocissus (Ampelopsis), Jungfernwein					
Engelmannii	R,B	1j. b. St.	30—60	6.80	53.—
quinquefolia, „Wilder Wein"	R,B	1j. b. St.	40—60	6.20	47.—
radicantissima (P. muralis)	R,B	1j. b. St.	30—60	6.80	53.—
Veitchii, Veitchii gigantea und Veitchii Gloire de Boskoop mit Topfballen	R	1j. Vg.	—	47.—	—
Philadelphus, Pfeifenstrauch, sogenannter „Jasmin"					
I. Hochwachsende Sorten:					
brachybotrys	H,R,S	1j. b. St.	40—70	9.50	—
coronarius	H,R,S	1j. b. St.	40—70	9.50	80.—
Falconeri	R,S	1j. b. St.	40—70	9.50	—
inodorus grandiflorus	H,R,S	1j. b. St.	40—70	9.50	—
latifolius	H,R,S	1j. b. St.	40—70	11.—	—
II. Mittelhochwachsende Sorten:					
Lemoinei Virginal	H,R,S	1j. b. St.	30—50	12.20	—
III. Niedrigbleibende Sorten:					
Lemoinei Avalanche	H,R,S	2j. v. St.	30—50	11.—	93.—
Lemoinei Dame blanche	H,R,S	2j. v. St.	30—50	11.—	—
Lemoinei erectus	H,R,S	2j. v. St.	30—50	11.—	93.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	50—70	26.50	240.—
Lemoinei Manteau d'hermine	H,St, R,S	2j. v. St.	20—40	11.—	—
Lemoinei Montblanc	H,R,S	2j. v. St.	30—50	11.—	93.—
Physocarpus, Blasenspiere					
opulifolius (Spiraea opulifolia)	H,S	1j. S.	30—50	5.50	40.—
		2j. v. S.	50—80	7.50	60.—
opulifolius luteus	H	1j. b. St.	40—70	9.50	80.—
Populus, Pappel					
alba nivea, Silberpappel	R	1j. b. St.	40—65	5.50	40.—
		1j. b. St.	65—100	7.50	60.—
angulata cordata robusta, äußerst schnell-	F	1j. b. St.	65—100	4.40	35.—
wüchsige Pappel	F	1j. b. St.	100—140	5.70	45.—
balsamifera, Balsampappel	R	1j. b. St.	65—100	6.80	53.—
		1j. b. St.	100—140	8.20	67.—
berolinensis, Berliner Lorbeerpappel	R	1j. b. St.	100—140	8.20	67.—
		1j. b. St.	140—180	9.50	87.—
canadensis, kanadische Pappel	F R	1j. b. St.	65—100	4.40	35.—
	F	1j. b. St.	100—140	5.70	45.—
nigra, Schwarzpappel	F R	1j. b. St.	65—100	4.40	35.—
	F	1j. b. St.	100—140	5.70	45.—
	F	1j. b. St.	140—180	7.90	64.—
nigra pyramidalis (P. nigra fastigiata oder nigra italica), italienische Pyramidenpappel	H,R	1j. b. St.	40—65	5.50	40.—
		1j. b. St.	65—100	6.80	53.—
Simonii	R	1j. b. St.	65—100	6.80	—
		1j. b. St.	100—140	8.20	—
Simonii fastigiata	R	1j. b. St.	65—100	9.50	—
		1j. b. St.	100—140	11.—	—
Potentilla, Fingerstrauch					
Farreri	H,St	2j. v. St.	15—30	11.—	93.—
Friedrichsenii	H,St	1j. S.	15—30	4.20	27.—
		2j. v. S.	40—60	6.80	53.—
		2j. v. St.	20—40	9.50	80.—
fruticosa	H,St	1j. S.	15—30	4.20	27.—
		2j. v. S.	40—60	6.80	53.—
		3j. v. S.	60—100	9.50	80.—
fruticosa Purdomii	H,St	2j. v. St.	15—30	11.—	93.—
		3j. v. St.	30—50	13.—	115.—
fruticosa Veitchii	H,St	2j. v. St.	15—30	11.—	93.—

			Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Prunus, Kirsche, Pflaume						
padus		H,S,B	2j. v. S.	20—40	7.50	60.—
			2j. v. S.	40—65	9.50	80.—
			3j. v. S.	65—100	12.20	107.—
			3j. v. S.	100—140	17.50	160.—
serotina, spätblühende Traubenkirsche	F	H,S,B	1j. S.	20—40	1.50	12.—
	F		1j. S.	40—60	2.50	20.—
	F		2j. v. S.	40—65	3.80	30.—
	F		3j. v. S.	65—100	5.70	46.—
spinosa, Schlehdorn		H,B,R	1j. S.	30—50	6.20	47.—
			1j. S.	50—80	8.80	73.—
			2j. v. S.	40—65	9.50	80.—
			3j. v. S.	65—100	12.20	107.—
virginiana, virginische Traubenkirsche		S,B	2j. v. S.	65—100	9.50	—
			3j. v. S.	100—140	14.—	—
Quercus, Eiche						
pedunculata (Qu. robur), deutsche Eiche, Stieleiche	F	H,R,B	1j. S.	7—15	1.20	9.—
	F		1j. S.	15—30	1.90	15.—
	F		3j. v. S.	30—50	5.—	40.—
	F		3j. v. S.	50—80	7.50	60.—
	F		4j. v. S.	80—100	11.30	90.—
			4j. v. S.	100—140	17.50	160.—
rubra, amerikanische Roteiche	F	R	1j. S.	7—15	1.20	9.—
	F		1j. S.	15—30	1.90	15.—
	F		3j. v. S.	30—50	5.—	40.—
	F		3j. v. S.	50—80	7.50	60.—
	F		4j. v. S.	80—100	11.30	93.—
Rhamnus, Faulbaum, Wegdorn						
cathartica, gemeiner Wegdorn		H,R	2j. v. S.	40—65	7.50	60.—
		S,B	3j. v. S.	65—100	9.50	80.—
frangula, gemeiner Faulbaum		H,R	2j. v. S.	40—65	7.50	60.—
		S,B	3j. v. S.	65—100	9.50	80.—
			3j. v. S.	100—140	11.—	93.—
aus halbweitem Stand, buschig			m/m. v.	100—140	24.—	215.—
Rhododendron, Alpenrose						
catawbiense grand. und arboreum- und catawbiense-Hybriden in Sorten		R,S,i	1j. Vg.	10—20	53.—	—
			2j. Vg.	20—30	88.—	—
Rhus, Sumach, Essigbaum						
cotinus, siehe Cotinus coggygria						
typhina		R	1j. S.	40—60	16.—	—
Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere						
alpinum		H,R,S	1j. b. St.	10—25	15.—	135.—
divaricatum (R. arboreum)		H,R,S	1j. b. St.	40—70	9.50	—
floridum		H,R,S	1j. b. St.	60—100	8.20	—
sanguineum		H,R,S	1j. b. St.	40—60	9.50	—
sanguineum atrorubens		H,R,S	1j. b. St.	40—60	11.—	—
Robinia pseudacacia, gemeine Akazie	F	H,R,B	1j. S.	30—50	1.30	10.—
	F		1j. S.	50—80	1.90	15.—
	F		2j. v. S.	65—100	5.—	40.—
	F		2j. v. S.	100—140	6.30	50.—
Rosa, Rose						
humilis lucida		B	2j. v. S.	40—70	6.80	—
aus halbweitem Stand, buschig			m/m. v.	40—70	22.—	200.—
rubiginosa		H,B	2j. v. S.	40—65	5.50	40.—
			2j. v. S.	65—100	9.50	80.—
aus halbweitem Stand, buschig			m/m. v.	60—100	22.—	200.—
rubrifolia		H,S,B	2j. v. S.	40—70	8.20	—
aus halbweitem Stand, buschig			m/m. v.	50—70	26.50	240.—
rugosa (R. rugosa Regeliana)		H,R,B	1j. S.	10—20	4.20	27.—
			1j. S.	20—40	5.50	40.—
			2j. v. S.	25—40	9.50	80.—
			2j. v. S.	40—70	12.20	107.—

		Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Rubus, Brombeere, Himbeere					
fruticosus, gemeine Brombeere	R,S,B	1j. S.	30—60	6.80	53.—
phoenicolasius	R	1j. v. S.	15—30	7.50	60.—
		1j. v. S.	30—50	9.50	80.—
Salix, Weide					
alba	R	1j. b. St.	100—140	7.50	60.—
alba splendens (S. alba argentea)	R	1j. b. St.	65—100	8.20	67.—
alba vitellina britzensis	R	1j. b. St.	65—100	8.20	67.—
alba vitellina pendula	R,Tr	1j. b. St.	65—100	9.50	80.—
caprea	R,S,B	1j. b. St.	65—100	12.20	107.—
		2j. v. S.	65—100	12.—	—
		2j. v. S.	100—140	15.—	—
caprea latifolia	R,S,B	1j. b. St.	40—65	12.20	—
cinerea	R,B	1j. b. St.	65—100	8.20	—
daphnoides (S. latifolia glabra)	R,B	1j. b. St.	100—140	8.20	67.—
daphnoides ruberrima	R,B	1j. b. St.	65—100	9.50	80.—
incana (S. rosmarinifolia)	R,B	1j. b. St.	30—60	9.50	—
pentandra (S. laurifolia)	H,R	1j. b. St.	65—100	8.20	67.—
purpurea nana	St,R	1j. b. St.	30—50	9.50	80.—
Smithiana	R,B	1j. b. St.	100—140	9.50	80.—
utilense	R,B	1j. b. St.	65—100	8.20	67.—
viminalis	R,B	1j. b. St.	100—140	8.20	67.—
Sambucus, Holunder					
canadensis	S	2j. v. S.	50—80	11.—	93.—
		2j. v. S.	80—120	13.50	120.—
nigra, gemeiner Holunder	H,S	1j. S.	30—50	4.20	27.—
		1j. S.	50—80	6.20	47.—
		2j. v. S.	50—80	9.50	80.—
		2j. v. S.	80—120	12.20	107.—
nigra lutea	S	1j. b. St.	40—70	11.—	—
racemosa, Traubenholunder	H,R,S	1j. S.	30—50	5.50	40.—
		1j. S.	50—80	6.80	53.—
		2j. S.	50—80	9.50	80.—
		2j. S.	80—120	11.—	93.—
		2j. v. S.	80—120	13.50	120.—
		2j. v. S.	120—150	17.50	160.—
Sorbus, Eberesche					
aria, gemeine Mehlbeere	R,B	3j. v. S.	40—65	7.50	60.—
		3j. v. S.	65—100	9.50	80.—
aucuparia, gewöhnliche Eberesche, Vogelbeere	F R,S,B	1j. S.	10—20	1.10	8.—
	F	1j. S.	20—40	1.50	12.—
	F	3j. v. S.	40—65	4.40	35.—
	F	3j. v. S.	65—100	5.70	45.—
suecica (S. scandica), nordische Eberesche	R,B	1j. S.	5—10	2.60	11.—
		1j. S.	10—20	3.35	18.50
		3j. v. S.	40—65	6.20	47.—
		3j. v. S.	65—100	7.50	60.—
		4j. v. S.	100—140	9.50	80.—
Spiraea, Spierstrauch					
albiflora (Sp. callosa alba)	H,St,B	2j. v. St.	10—20	11.—	93.—
arcuata	H,B	2j. v. St.	15—30	16.—	—
arguta	H,St,B	2j. v. St.	20—40	21.50	—
		3j. v. St.	40—60	26.50	—
ariaefolia, siehe Holodiscus discolor ariaefolius					
Billiardii	R,B	1j. b. St.	30—50	9.50	80.—
Douglasii	H,B	1j. b. St.	30—50	9.50	80.—
hypericifolia truncata (Sp. thalictroides)	S,St,B	2j. v. St.	15—30	11.—	93.—
opulifolia und opulifolia lutea, siehe Physocarpus opulifolius					
pumila Anthony Waterer (Sp. Bumalda Anthony Waterer)	H,St, R,B	2j. v. St.	10—20	11.50	93.—
pumila Froebelii (Sp. callosa Froebelii)	H,St R,B	2j. v. St.	15—30	11.—	93.—
tomentosa	H,B	2j. v. St.	10—20	11.—	—
Vanhouttei	H,R,B	1j. b. St.	20—40	9.50	80.—
		2j. v. St.	30—50	11.—	93.—
Staphylea pinnata, Pimpernuß	S,B	1j. S.	8—15	8.50	—

		Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Stephanandra incisa (St. flexuosa), Kranzspiere	St	2j. v. St.	15—30	11.—	—
Symphoricarpus, Schneebeere					
Chenaultii	H,R, S,B	1j. b. St.	30—50	9.50	80.—
Giraldii	H,R, S,B	1j. b. St.	30—50	9.50	—
orbiculatus	H,R, S,B	1j. b. St.	30—50	9.50	80.—
racemosus	H,R,	1j. S.	15—30	4.80	33.—
	S,B,	2j. v. S.	40—65	8.80	73.—
		2j. v. S.	65—100	11.—	93.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	60—100	26.50	240.—
Syringa, Syringe					
reflexa	B	3j. v. S.	40—65	11.50	100.—
		3j. v. S.	65—100	13.50	120.—
tomentella	H,B	3j. v. S.	65—100	11.50	100.—
		3j. v. S.	100—140	13.50	120.—
vulgaris	H,B	2j. S.	20—40	3.90	24.—
		3j. v. S.	40—65	5.50	40.—
vulgaris alba	H,B	3j. v. S.	65—100	11.—	—
vulgaris in veredelten Sorten	H,B	1j. Vg.	50—100	44.—	—
Tamarix, Tamariske					
parviflora (T. tetrandra purpurea)		1j. b. St.	40—60	9.50	—
tetrandra		1j. b. St.	40—60	9.50	—
Teucrium chamaedrys, Gamander	H,St,i	3j. v. St.	10—20	13.50	120.—
Tilia, Linde					
grandifolia (T. platyphyllos), großblättrige Linde, Sommerlinde	B	1j. S.	10—20	3.10	16.—
		1j. S.	20—40	4.80	33.—
		3j. v. S.	50—80	8.80	73.—
		3j. v. S.	80—120	13.50	120.—
		4j. v. S.	120—150	15.—	135.—
parvifolia, kleinblättrige Linde, Stein- oder	F	1j. S.	5—10	1.50	12.—
Winterlinde	F	1j. S.	10—20	2.20	18.—
	F	3j. v. S.	50—80	7.50	60.—
		3j. v. S.	80—120	13.50	120.—
		4j. v. S.	120—150	17.50	160.—
aus halbweitem Stand, buschig		m/m. v.	80—120	40.—	360.—
" " " "		m/m. v.	120—150	53.—	480.—
Ulex europaeus, Stechginster	St,R,i	1j. S.	15—30	4.20	27.—
mit Topfballen		1j. S.	20—30	33.—	—
Ulmus, Ulme, Rüster					
campestris, Feldulme oder -Rüster	F H,R,S,	2j. v. S.	40—65	4.40	35.—
	F B	3j. v. S.	65—100	7.30	58.—
scabra (U. montana), Bergulme oder -Rüster	F H,R,S	1j. S.	10—20	1.30	10.—
	F	2j. v. S.	40—65	4.40	35.—
	F	3j. v. S.	65—100	7.30	58.—
Viburnum, Schneeball					
lantana	H,R,S	1j. S.	8—15	5.50	40.—
		2j. S.	10—20	6.80	53.—
		2j. v. S.	30—50	9.50	—
		3j. v. S.	50—80	12.20	—
		3j. v. S.	80—120	16.—	—
opulus	H,S	1j. S.	10—20	6.20	47.—
		2j. v. S.	20—40	11.50	100.—
		3j. v. S.	40—65	12.20	107.—
		4j. v. S.	80—120	20.—	180.—
		4j. v. S.	140—180	22.—	200.—
opulus sterile		1j. b. Abs.	25—50	13.50	120.—
		2j. v. Abs.	20—40	16.50	—
Weigela, siehe Diervilla					

		Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
III. Junge Nadelhölzer (Koniferen)					
Abies, Tanne, Edeltanne					
alba (A. pectinata), Edel- oder Weißtanne F	S	2j. S.	—	0.80	6.—
F		3j. v. S.	8—15	2.20	18.—
F		4j. v. S.	12—25	3.40	27.—
balsamea, Balsamtanne		2j. S.	—	4.20	27.—
		3j. v. S.	10—15	6.20	47.—
		4j. v. S.	12—25	7.50	60.—
cephalonica, griechische Weißtanne		2j. S.	—	6.50	50.—
		3j. v. S.	10—15	13.50	—
concolor, kalifornische Weißtanne	R	2j. S.	—	4.80	33.—
		3j. v. S.	10—15	9.50	80.—
		4j. v. S.	12—25	11.—	93.—
		4j. v. S.	15—30	12.20	107.—
grandis, große, kalifornische Küstentanne		2j. S.	—	5.10	36.—
		3j. v. S.	15—30	7.50	60.—
		4j. v. S.	20—40	9.50	—
Nordmanniana, Nordmannstanne		2j. S.	—	4.80	33.—
		3j. v. S.	8—15	8.20	67.—
		4j. v. S.	10—20	9.50	80.—
pectinata, siehe A. alba					
pinsapo		3j. v. S.	8—15	9.50	—
Veitchii, Veitchs Weißtanne		2j. S.	—	5.50	40.—
		3j. v. S.	8—15	6.80	—
Biota orientalis, siehe Thuja orientalis					
Buxus, Buchsbaum, siehe „Laubhölzer"					
Cedrus, Zeder					
atlantica, Atlaszeder		1j. S.	—	9.50	80.—
deodara, Himalajazeder		1j. S.	—	9.50	80.—
		2j. v. S.	10—20	17.50	—
Chamaecyparis, Lebensbaum-Zypresse					
Lawsoniana, Lawsons-Zypresse, gewöhnl. Zypresse	H,R	2j. S.	—	2.60	11.—
		3j. v. S.	20—40	6.30	48.—
Laws. Alumii	H	2j. v. St.	12—25	24.—	215.—
		3j. v. St.	20—35	36.—	330.—
Laws. erecta viridis		3j. v. St.	20—35	29.50	—
Laws. Fletcheri	St	2j. v. St.	10—20	24.—	—
		3j. v. St.	20—35	32.—	—
Laws. forsteckensis	St	1j. Vg.	5—10	53.—	—
Laws. glauca	H,R	3j. v. St.	20—30	26.50	—
Laws. minima glauca	St	1j. Vg.	5—10	47.—	—
Laws. Rosenthalii	H	3j. v. St.	20—30	33.—	—
Laws. Stewartii		1j. Vg.	10—25	36.—	—
obtusa pygmaea	St	1j. Vg.	5—10	40.—	—
pisifera	H	m/m. v.	40—60	32.—	—
		m/m. v.	60—80	37.—	—
pisifera aurea	H	3j. v. St.	20—30	26.50	—
pisifera plumosa	H,R	2j. v. St.	10—25	17.50	160.—
		3j. v. St.	20—35	22.—	—
pisifera plumosa aurea	H	2j. v. St.	10—25	17.50	160.—
		3j. v. St.	20—35	22.—	—
pisifera squarrosa	H,R	2j. v. St.	10—25	21.50	—
		3j. v. St.	20—35	26.50	—
pisifera squarrosa aurea		2j. v. St.	10—25	21.50	—
pisifera sulphurea	St	3j. v. St.	20—35	26.50	—
Cryptomeria, japanische Cryptomerie					
japonica		2j. S.	—	6.20	47.—
japonica elegans	St	3j. v. St.	15—30	36.—	—
Ginkgo biloba, Fächerbaum, Ginkgobaum		1j. S.	10—20	9.50	80.—
		2j. v. S.	20—40	13.50	120.—
		3j. v. S.	40—65	22.—	200.—
		4j. v. S.	65—100	33.—	300.—
Ilex aquifolium, siehe „Laubhölzer"					

		Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Juniperus, Wacholder					
chinensis Pfitzeriana	H,St,	2j. v. St.	10—18	26.50	240.—
	R,S	3j. v. St.	15—25	44.—	400.—
chinensis procumbens aurea (J. japonica aurea)	St	2j. v. St.	—	40.—	—
		3j. v. St.	10—15	67.—	—
communis	R,S	1j. S.	—	4.80	33.—
		2j. v. S.	10—25	7.50	60.—
communis cracovica		3j. v. St.	15—35	33.—	300.—
communis hibernica		2j. v. St.	12—20	24.—	215.—
		3j. v. St.	15—35	33.—	300.—
communis hibernica pyramidalis		3j. v. St.	15—35	33.—	300.—
communis montana (J. communis nana)	St	2j. v. St.	8—15	33.—	—
		3j. v. St.	10—20	44.—	—
communis suecica		2j. v. St.	12—20	24.—	215.—
		3j. v. St.	15—35	33.—	300.—
horizontalis (J. prostrata)	St	2j. v. St.	8—15	33.—	300.—
		3j. v. St.	12—25	44.—	400.—
sabina femina	St,R	2j. v. St.	8—15	26.50	—
		3j. v. St.	12—25	32.—	—
sabina mas	St,R	2j. v. St.	8—15	26.50	240.—
		3j. v. St.	15—25	32.—	290.—
sabina tamariscifolia	St	3j. v. St.	10—25	53.—	—
squamata Meyeri	St	2j. v. St.	8—12	40.—	—
		3j. v. St.	12—18	53.—	—
virginiana	R	1j. S.	—	4.20	27.—
		2j. v. S.	10—25	7.50	60.—
virginiana horizontalis		3j. v. St.	12—25	32.—	—
virginiana tripartita	St	3j. v. St.	15—25	32.—	—
Larix, Lärche					
decidua (L. europaea), gemeine europäische	F	1j. S.	7—15	1.50	11.—
Lärche, aus anerkanntem Saatgut	F	1j. S.	10—25	1.70	13.—
	F	2j. v. S.	20—40	4.40	35.—
	F	3j. v. S.	30—50	6.—	48.—
	F	3j. v. S.	50—80	7.50	60.—
leptolepis, japanische Lärche	F	1j. S.	7—15	1.50	11.—
	F	1j. S.	10—25	1.70	13.—
	F	3j. v. S.	30—50	6.—	48.—
	F	3j. v. S.	50—80	7.50	60.—
Picea, Fichte, Tanne					
bicolor (P. Alcockiana)	R	2j. S.	—	5.50	40.—
canadensis (P. alba), nordamerikanische Weiß-	F	2j. S.	7—20	0.50	3.40
fichte	F	3j. v. S.	20—40	1.70	13.—
	F	4j. v. S.	25—50	2.30	18.50
	F	5j. v. S.	40—70	3.10	25.—
Engelmannii	R	4j. v. S.	10—25	5.50	40.—
excelsa, gemeine Fichte oder Rottanne	F	2j. S.	10—25	0.60	4.50
	F	3j. v. S.	15—35	1.40	11.—
	F	4j. v. S.	20—40	2.10	16.50
	F	4j. v. S.	25—50	2.30	18.50
	F	4j. v. S.	30—60	2.60	21.—
	F	5j. v. S.	40—70	3.10	25.—
		m/m. v.	30—50	15.—	135.—
		m/m. v.	40—60	17.—	160.—
excelsa Maxwellii	St	3j. v. St.	8—15	47.—	—
excelsa pumila	St	3j. v. St.	8—12	47.—	—
excelsa pygmaea	St	3j. v. St.	8—15	47.—	—
omorika, Omorikafichte, serbische Fichte	H,R	2j. S.	8—20	5.50	40.—
		3j. v. S.	15—30	8.20	67.—
		4j. v. S.	20—40	11.—	93.—
		m/m. v.	30—40	47.—	430.—
		m/m. v.	40—50	60.—	540.—
orientalis, morgenländische Fichte	S	4j. v. S.	12—20	7.50	60.—
pungens, Stechfichte	H,R	2j. S.	—	2.70	12.—
		3j. v. S.	10—20	3.50	20.—
		4j. v. S.	15—25	4.20	27.—
		m/m. v.	30—40	20.—	180.—
pungens glauca, Blaufichte	H,R	2j. S.	—	3.25	17.50
		3j. v. S.	10—20	6.—	45.—
		4j. v. S.	15—30	8.80	73.—
pungens glauca Kosteri, Blaufichte		1j. Vg.	8—15	67.—	—

			Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Picea (Fortsetzung)						
pungens glauca Vuykii, Blaufichte			1j. Vg.	8—15	60.—	—
			2j. Vg.	15—25	107.—	—
sitchensis, Sitkafichte	F	H	2j. S.	10—25	1.30	10.—
	F		3j. v. S.	20—40	3.20	25.—
Pinus, Kiefer, Föhre						
cembra, Zürbelkiefer		R	2j. S.	—	4.80	33.—
			3j. v. S.	8—15	6.80	53.—
excelsa, Tränenkiefer			2j. S.	—	4.45	29.50
laricio austriaca, siehe P. nigra austriaca						
leucodermis, Schlangenhautkiefer			4j. v. S.	10—15	8.80	73.—
montana, Berg- oder Krummholzkiefer	F	H,R	2j. S.	—	0.80	6.—
	F		3j. v. S.	8—15	2.50	20.—
			4j. v. S.	15—30	8.20	67.—
			m/m. v.	20—30	17.50	160.—
			m/m. v.	30—40	29.—	265.—
montana mughus		H,R	2j. S.	—	2.85	13.50
			3j. v. S.	8—12	6.20	47.—
			4j. v. S.	12—25	9.50	80.—
			m/m. v.	20—30	26.50	240.—
			m/m. v.	30—40	44.—	400.—
montana pumilio		St,R	2j. S.	—	3.50	20.—
			4j. v. S.	10—15	12.20	107.—
nigra austriaca (P. laricio austriaca), öster-	F	R	2j. S.	—	1.20	9.—
reichische Schwarzkiefer	F		3j. v. S.	12—25	2.80	22.—
ponderosa, Gelbkiefer			2j. S.	—	3.65	21.50
silvestris, gemeine Kiefer, aus anerkanntem	F		1j. S.	I.Gütekl	0.40	2.65
Saatgut	F		2j. v. S.	7—15	1.30	10.—
strobus, Weymouthskiefer	F		2j. v. S.	8—15	1.50	12.—
	F		3j. v. S.	15—30	2.20	18.—
	F		4j. v. S.	20—40	2.50	20.—
Pseudotsuga, Douglastanne						
taxifolia caesia, graue Fraser-Douglasfichte		R	2j. S.	8—15	4.20	27.—
			3j. v. S.	20—40	6.20	47.—
			4j. v. S.	30—60	9.50	80.—
taxifolia glauca, blaue Form		R	2j. S.	—	4.20	27.—
taxifolia viridis, grüne Form	F		2j. S.	15—30	3.50	28.—
	F		3j. v. S.	20—40	6.—	46.—
Sciadopitys verticillata, japanische Schirmtanne			1j. S.	—	16.—	—
Sequoia gigantea (Wellingtonia gigantea), Mammutbaum mit Topfballen			2j. v. S.	15—30	67.—	—
Taxodium distichum, Sumpf-Zypresse		R	3j. v. S.	40—65	12.70	—
			3j. v. S.	65—100	16.—	—
Taxus, Eibe						
baccata		H,R,S	1j. S.	—	6.20	47.—
			2j. S.	—	8.80	73.—
			2j. v. S.	6—10	11.50	100.—
			3j. v. S.	7—15	15.—	135.—
			4j. v. S.	15—30	22.—	200.—
baccata fastigiata (T. hibernica)		R,S	3j. v. St.	8—12	26.50	—
baccata fastigiata aureo-variegata			3j. v. St.	8—12	26.50	—
			4j. v. St.	10—20	40.—	—
baccata repandens			2j. v. St.	8—12	33.—	—
Thuja, Lebensbaum						
gigantea		H	2j. S.	—	3.10	16.—
gigantea aurescens		H	m/m. v.	30—40	44.—	—
			m/m. v.	40—60	53.—	—

		Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Thuja (Fortsetzung)					
occidentalis	H,R	2j. S.	—	2.30	8.—
		3j. v. S.	15—30	4.80	33.—
		4j. v. S.	20—45	6.80	53.—
		4j. v. S.	25—50	7.50	60.—
		4j. v. S.	30—60	8.20	67.—
		m/m. v.	30—40	20.—	180.—
		m/m. v.	40—60	27.50	250.—
occ. Ellwangeriana	H	2j. v. St.	10—20	19.—	—
		3j. v. St.	15—25	21.50	—
occ. Ellwangeriana elegantissima	H	2j. v. St.	10—20	21.50	—
occ. Ellwangeriana Rheingold	St	3j. v. St.	15—25	29.50	—
occ. recurva nana	St,R	2j. v. St.	5—10	21.50	—
		3j. v. St.	10—25	26.50	—
orientalis (Biota orientalis)		3j. v. S.	10—20	7.50	60.—
		4j. v. S.	30—60	9.50	80.—
Thujopsis dolabrata, japanischer Lebensbaum	R	3j. v. St.	20—30	26.50	—
Tsuga, Hemlockstanne					
canadensis	H,S	2j. S.	—	6.80	53.—
		3j. v. S.	15—25	11.—	93.—
		4j. v. S.	20—35	13.50	120.—
		m/m. v.	25—40	40.—	360.—
diversifolia		2j. S.	—	6.80	—
Mertensiana		3j. v. S.	10—20	11.—	—
Sieboldii		2j. S.	—	6.80	53.—
Wellingtonia gigantea, siehe Sequoia gigantea					

MEINE LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

(unter Zugrundelegung der Lieferungsbedingungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand). Die Bedingungen gelten zwischen mir und dem Auftraggeber als rechtlich bindend.

PREISE UND ZAHLUNG.

1. Die Preise gelten in Reichsmark ohne Skonto- und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Art und Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen).
4. Erfüllungsort ist Rellingen, ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich Rellingen, in allen anderen Fällen nach meiner Wahl Rellingen oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden, wenn nicht in ausländischer Währung fakturiert ist, nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Preisverzeichnisse und Angebote verlieren die früheren ihre Gültigkeit.
7. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
8. Verkäufer ist berechtigt, die Lieferung bis zur Zahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern, wenn sich nach erfolgter Auftragsbestätigung herausstellt, daß infolge schlechter Vermögensverhältnisse des Käufers der Anspruch auf Zahlung des Kaufwertes gefährdet ist.

VERSAND UND VERPACKUNG.

9. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
10. Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
11. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.
12. Für alle im Auftrage des Bestellers ausgeführten Sammelladungen lehne ich jede Verantwortung ab und zwar sowohl für die eigene als auch für fremde Ware.

ROLLGELD UND VERPACKUNGSKOSTEN.

13. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt, wenn nicht anders ausdrücklich vereinbart ist, der Besteller. Die Berechnung erfolgt nach den ortsüblichen Sätzen. Rollgeld und Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

GEWÄHRLEISTUNG.

14. Eine Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
15. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert geleistet, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen worden sind. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

BESCHWERDEN UND ERSATZ.

16. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

SORTENERSATZ.

17. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
18. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

MUSTER UND MASSE.

19. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen. Es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
20. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
21. Für alle Lieferungen sind die Güteklassenbezeichnungen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

TRANSPORTVERSICHERUNG.

22. Alle Sendungen ins Ausland und alle Waggonladungen innerhalb Deutschlands werden für den Transport zu Lasten des Empfängers versichert. Gerade für diese Sendungen, deren Transport mehr gefährdet ist als der von Stückgutsendungen, hat sich die Transportversicherung bestens bewährt. Die sehr geringen Unkosten für Transportversicherung beseitigen nun das bisherige Risiko, das der Auftraggeber während des Transportes der Pflanzen tragen mußte.

FORSTPFLANZEN.

23. Bei Lieferung von mit einem F bezeichneten Forstpflanzen gelten die Lieferungsbedingungen gemäß der Verordnung zur Regelung des Absatzes und der Preise für Forstsamen und Forstpflanzen vom 17. September 1938, die ich als bekannt voraussetze, andernfalls ich dieselben anzufordern bitte.

Tabelle für Frachtberechnung

(Ohne Gewähr)

Spezialtarif für lebende Pflanzen, die als Eilgut zum Frachtgutsatz reisen, wenn die einzelnen Packstücke nicht länger als 4 m und nicht schwerer als 150 kg sind. Bei Waggonladungen fällt die Beschränkung bezüglich Länge und Gewicht fort.

Für gedeckte Wagen kommen 5 % Aufschlag in Anrechnung.

Von Station Pinneberg nach:	Stückgut, verpackt	Waggonladung unverpackt		Von Station Pinneberg nach:	Stückgut, verpackt	Waggonladung unverpackt	
	100 kg	5000 kg	10000 kg		100 kg	5000 kg	10000 kg
	RM.	RM.	RM.		RM.	RM.	RM.
Aachen	7.40	107.50	182.—	Koblenz Hbf.	7.60	112.—	189.—
Augsburg Hbf.	9.40	136.50	231.—	Kolberg	7.60	110.—	186.—
Aussig	8.—	117.50	199.—	Konstanz	9.90	144.50	244.—
Bamberg	8.20	119.50	202.—	Köln Gereon	7.—	100.—	169.—
Basel D. Rb.	9.80	141.50	240.—	Königsberg/Pr. Hbf.	9.80	142.50	241.—
Bebra	6.10	89.—	151.—	Leer (Ostfr.)	4.30	63.50	108.—
Berlin Hbg. u. Lehrt. Bf	5.40	76.50	130.—	Leipzig M. Th. Bf.	6.40	91.50	155.—
Bielefeld Hbf.	4.60	65.50	111.—	Liegnitz	8.—	117.50	199.—
Braunschweig Hbf.	4.10	58.—	98.—	Linz	9.90	145.—	245.—
Bremen Hbf.	2.90	42.50	72.—	Magdeburg Hbf.	4.90	69.50	118.—
Breslau Ost	8.60	125.50	212.—	Mainz Hbf.	8.—	117.—	198.—
Celle	3.20	47.—	79.—	Mannheim Hbf.	8.40	122.—	207.—
Chemnitz Hbf.	7.20	104.50	177.—	München Hbf.	9.60	140.50	238.—
Darmstadt Hbf.	8.—	115.50	196.—	Neumünster	1.60	22.—	37.—
Dortmund Hbf.	5.90	84.50	143.—	Nürnberg	8.80	127.50	216.—
Dresden Neustadt	7.20	105.50	178.—	Oldenburg (Oldbg.)	3.80	52.—	88.—
Düsseldorf Hbf.	6.60	95.—	161.—	Osnabrück	4.60	65.50	111.—
Elbing	9.20	135.—	229.—	Passau	9.60	140.50	238.—
Erfurt	6.60	95.50	162.—	Regensburg Hbf.	9.20	132.—	223.—
Essen Hbf.	6.10	89.50	152.—	Reichenberg (Sudeteng.)	8.20	119.—	201.—
Eydtkau	10.10	147.—	249.—	Rendsburg	2.30	32.—	54.—
Flensburg	3.20	47.—	79.—	Seestadt Rostock Hbf	4.30	60.50	102.—
Frankfurt (Oder)	6.40	92.50	156.—	Saarbrücken Hbf.	9.20	132.—	223.—
Frankfurt/Main Hbf.	7.80	112.50	190.—	Salzburg	9.80	144.50	244.—
Fulda	6.80	99.—	167.—	Schwerin (Meckl.)	3.20	44.—	75.—
Gleiwitz Hbf.	9.40	138.—	233.—	Stettin Hbf.	6.10	89.50	152.—
Glogau	7.80	114.—	193.—	Stralsund	5.10	76.—	129.—
Görlitz	7.60	111.—	188.—	Stuttgart Hbf.	9.20	132.—	223.—
Göttingen	5.10	75.—	127.—	Tilsit	9.40	138.—	233.—
Graz Hbf.	10.30	151.—	255.—	Trier Hbf.	8.40	123.50	209.—
Halberstadt	4.90	71.—	120.—	Troppau Ost	9.40	139.—	235.—
Halle (Saale)	5.90	86.—	145.—	Uelzen	2.50	34.—	57.—
Hannover Hbf.	3.80	52.—	88.—	Ulm	9.40	116.50	197.—
Hof Hbf.	7.60	112.—	189.—	Warnemünde	4.30	63.50	108.—
Innsbruck	9.90	145.—	245.—	Wesel	6.10	89.50	152.—
Jena Saalbf.	6.80	99.50	168.—	Wien Südbf.	10.—	147.—	249.—
Karlsbad	8.20	119.—	201.—	Worms	8.20	120.50	204.—
Karlsruhe Hbf.	8.80	127.50	216.—	Wuppertal-Elberfeld	6.40	92.50	156.—
Kassel Hbf.	5.90	86.—	145.—	Würzburg Hbf.	7.80	114.50	194.—
Kiel Hbf.	2.30	29.50	50.—	Zwickau (Sachsen)	7.20	104.50	177.—
Klagenfurt	10.30	149.50	253.—				

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

C. D. C. HEYDORNS BUCHDRUCKEREI
UETERSEN IN HOLSTEIN